Bacterina

Adbac 11 vías®

No. DE REGISTRO B-0970-011 **USO VETERINARIO** Suspensión inyectable

Ficha técnica

Fórmula

Cada 1 mL contiene:

Clostridium chauvoei	1×10^9 UFC
Clostridium septicum	1×10^9 UFC
Clostridium novyi	1×10^9 UFC
Clostridium sordellii	1×10^9 UFC
Clostridium perfringens tipo C	1.5×10^8 UFC
Clostridium perfringens tipo D	1.5×10^8 UFC
Pasteurella multocida tipo A	4×10^7 UFC
Pasteurella multocida tipo D	4×10^7 UFC
Mannheimia haemolytica serotipo A1	3×10^8 UFC
Histophilus somni (Haemophilus somnus)	3×10^9 UFC
Adsorbidas en hidróxido de aluminio	0.25 %

Mecanismo de acción

Al administrar **Adbac 11 vías** cada uno de los antígenos de la bacteria (microorganismos inactivados y toxoide vacunales) entran en contacto con el organismo del animal, estos son identificados como sustancias extrañas al organismo por parte de las células de defensa mismas que envían la información correspondiente al sistema formador de anticuerpos, así como células específicas, de esta forma se desarrolla la inmunidad especifica de memoria en contra de las bacterias y toxinas patógenas que desencadenan las enfermedades de las cuales **Adbac 11 vías** desarrolla la protección.

Indicaciones

Adbac 11 vías está indicada para la prevención del carbón sintomático (pierna negra), edema maligno, hepatitis necrótica infecciosa, enterotoxemias, miositis, pasteurelosis, infecciones por *Mannheimia haemolytica* e *Histophilus somni (Haemophilus somnus)* en bovinos, caprinos y ovinos.

Dosis

Bovinos: **5 mL**

Caprinos y ovinos: **2.5 mL**

Vía de administración

Intramuscular o subcutánea.

Advertencias

Agítese antes de usarse. Cuando se administren por primera vez, debe aplicarse un refuerzo 2 a 3 semanas después. La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina y/o antihistaminico. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Tiempo de retiro

No administrar este producto 21 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano. No hay período de retiro en leche.

Almacenamiento

Consérvese en refrigeración entre 4 a 8 °C. Evite la congelación y la exposición a la luz solar directa. Deseche por medio de la incineración. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Presentaciones

Frascos de 50, 100 y 250 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:
GT: MX542-64-421-14969 NI: MV-14150 PA: SV: HN: MV-2-1003
® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.
Tel: (33) 3133-8595.

Adler® www.adler-la.com