

Adbac 7 vías®

Ficha técnica

No. DE REGISTRO B-0970-010 USO VETERINARIO Suspensión inyectable

Fórmula



Cada 1 mL contiene:

<i>Clostridium chauvoei</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium septicum</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium novyi</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium sordellii</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium perfringens</i> tipo C.....	1 x 10 ⁸ UFC
<i>Clostridium perfringens</i> tipo D.....	1 x 10 ⁸ UFC
Adsorbidos en hidróxido de aluminio.....	0.25%

Descripción



Adbac 7 vías es una bacterina inactivada que contiene toxoides (antígenos) capaces de estimular al sistema inmunológico, para dar inicio a una serie de sustancias químicas y células que participan en la formación de anticuerpos característicos de la inmunidad activa.

Indicaciones



Adbac 7 vías es una bacterina indicada para la prevención del Carbón Sintomático, Edema Maligno, Hepatitis Necrótica Infecciosa y Enterotoxemias causadas por *Clostridium* en Bovinos, Caprinos y Ovinos.

Enfermedades que cursan con los siguientes signos:

AFECCIONES AL MÚSCULO

Carbón sintomático, producido por *C. chauvoei*.

Edema maligno, causado por *C. septicum*.

Otras miositis originadas por *C. novyi* y *C. sordellii*, mismos que también pueden encontrarse en combinaciones con *C. chauvoei* y *C. septicum* en la zona afectada complicando la lesión y el pronóstico.

AFECCIONES AL RIÑÓN

Siendo el agente etiológico *C. perfringens* tipo D.

ENTEROTOXEMIA



Causadas por *C. sordellii* y *C. perfringens* tipos B, C y D.

AFECCIONES AL HÍGADO

Hepatitis necrótica infecciosa, causada por *C. novyi*.

Dosis



ESPECIE	DOSIS	FRECUENCIA
	5 mL	Cada 6 meses o cada año dependiendo de la incidencia en la zona
	2.5 mL	

A criterio del Médico Veterinario Zootecnista.

RECOMENDACIONES: Adbac 7 vías debe ser aplicada a partir de los 2 a 3 meses de edad, revacunando 21 días después. Los animales adultos se revacunarán cada 6 a 12 meses evitando que descendan los niveles de anticuerpos. Los animales deben ser inmunizados estando desparasitados, no estresados y en perfecto estado de salud para que la protección sea la adecuada.



Vía de administración



Intramuscular y/o subcutánea.

Advertencias



Agítese antes de usarse. La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina. Aplíquese en animales sanos. Cuando se administre por vez primera debe aplicarse un refuerzo 2 a 3 semanas después. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Tiempo de retiro



No usar este producto 21 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

Almacenamiento



Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C. Evite la congelación y la exposición a la luz directa. Deseche por medio de la incineración. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Presentaciones



Fascos de 50 y 250 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:
GT: MX542-64-02-6943 NI: MV-9589 PA: SV: VE2019055569 HN: MV-2-929
® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.
Tel: (33) 3133-8595. Importado y Distribuido en El Salvador por: COVESA, S.A. DE C.V.

Adler®

www.adler-la.com