

Fórmula



Cada 1 mL contiene:

<i>Clostridium chauvoei</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium septicum</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium novyi</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium sordellii</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium perfringens</i> tipo B.....	1.5 x 10 ⁸ UFC
<i>Clostridium perfringens</i> tipo C.....	1.5 x 10 ⁸ UFC
<i>Clostridium perfringens</i> tipo D.....	1.5 x 10 ⁸ UFC
<i>Pasteurella multocida</i>	3 x 10 ⁸ UFC
<i>Mannheimia haemolytica</i> serotipo A1.....	3 x 10 ⁸ UFC
<i>E. coli</i>	1 x 10 ⁹ UFC
Adsorbidas en hidróxido de aluminio.....	0.25 %

Indicaciones



Adbac 8 vías está indicada para la prevención de las principales clostridiasis que afectan a los rumiantes de cualquier edad, evitando la presentación de las siguientes enfermedades infecciosas:

AFECCIONES AL MÚSCULO

Carbón sintomático, producido por *C. chauvoei*.

Edema maligno, causado por *C. septicum*.

Otras miositis originadas por *C. novyi* y *C. sordellii*, mismos que también pueden encontrarse en combinaciones con *C. chauvoei* y *C. septicum* en la zona afectada complicando la lesión y el pronóstico.

AFECCIONES AL RIÑÓN

Siendo el agente etiológico *C. perfringens* tipo D.

ENTEROTOXEMIA

Causadas por *C. sordellii* y *C. perfringens* tipos B, C y D.

AFECCIONES AL HÍGADO

Hepatitis necrótica infecciosa, causada por *C. novyi*.

RECOMENDACIONES:


Adbac 8 vías debe ser aplicada a partir de los 2 a 3 meses de edad, revacunando 21 días después. Los animales adultos se revacunarán cada 6 a 12 meses evitando que disminuyan los niveles de anticuerpos. Los animales deben ser inmunizados estando desparasitados, no estresados y en perfecto estado de salud para que la protección sea la adecuada.

Dosis



ESPECIE	DOSIS	FRECUENCIA
	5 mL	Cada 6 meses o cada año dependiendo de la incidencia en la zona
	2.5 mL	

A criterio del Médico Veterinario Zootecnista.



Vía de administración



Intramuscular o subcutánea.

Advertencias



Agítese antes de usarse. Cuando se administre por primera vez debe aplicarse un refuerzo 2 a 3 semanas después. La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas, antídoto: epinefrina y/o antihistamínicos. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Tiempo de retiro



No usar este producto 21 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano. No hay periodo de retiro en leche.

Condiciones de almacenamiento



Consérvese en refrigeración entre 4 a 8 °C. Evite la congelación y la exposición a la luz solar directa. Deseche por medio de la incineración. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Presentaciones



Frascos de 50, 100 y 250 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:

GT: MX542-64-421-14968 NI: PA: SV: HN: MV-2-1019

® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.

Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.

Tel: (33) 3133-8595.