

Adbac Triple Bovina

Ficha técnica

No. DE REGISTRO B-0970-009 USO VETERINARIO Suspensión inyectable



Fórmula



Cada 1 mL contiene:

<i>Clostridium chauvoei</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium septicum</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Pasteurella multocida</i> tipo A	4 x 10 ⁷ UFC
<i>Pasteurella multocida</i> tipo D	4 x 10 ⁷ UFC
Adsorbidas en hidróxido de aluminio	0.25%

Descripción



Adbac Triple Bovina es una bacterina inactivada que contiene toxoides (antígenos) capaces de estimular al sistema inmunológico, para dar inicio a una serie de sustancias químicas y células que participan en la formación de anticuerpos característicos de la inmunidad activa.

Indicaciones



Adbac Triple Bovina se utiliza para la prevención y control de Carbón sintomático, Pasteurelisis neumónica y Edema maligno, enfermedades que cursan con los siguientes signos:

Carbón sintomático:

Fiebre, debilidad, temblores, zonas afectadas oscuras con presencia de gas fétido, cojera y postración. Muertes súbitas.

Edema maligno:



Fiebre, cojera, rigidez; puede o no presentarse enfisema. Lesiones edematosas y enrojecidas. Piel tensa y oscura en los últimos estadios.

Pasteurelisis neumónica:

Inapetencia, fiebre, pérdida de peso, trastornos respiratorios, tos, lagrimeo, secreción nasal y diarrea sanguinolenta.

Dosis



ESPECIE	DOSIS	FRECUENCIA
	5 mL	Cada 6 meses o cada año dependiendo de la incidencia en la zona
	2.5 mL	

A criterio del Médico Veterinario Zootecnista.

RECOMENDACIONES: Adbac Triple Bovina en edades donde no haya interferencia con los anticuerpos maternos, pudiendo ser a partir de los 2 a 3 meses de edad, revacunando a los 21 días después. Los animales adultos se revacunarán cada 6 a 12 meses para evitar que descendan los niveles de anticuerpos y se mantenga siempre el nivel óptimo, impidiendo el establecimiento de la enfermedad.

Los animales deben ser vacunados utilizando agujas y jeringas estériles, y deberán estar desparasitados, no estresados y en perfecto estado nutricional y de salud para que la protección ante tales enfermedades sea adecuada.

Vía de administración



Intramuscular y/o subcutánea.

Advertencias



Agítese antes de usarse. La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina. Aplíquese en animales sanos. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Tiempo de retiro



No usar este producto 21 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

Almacenamiento



Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C. Evite la congelación y la exposición a la luz directa. Deseche por medio de la incineración. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Presentaciones



Frascos de 50, 100 y 250 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:
GT: MX542-64-421-6942 NI: MV-9588 PA: RB-516-13 SV: VE2019055565 HN: MV-2-927
® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.
Tel: (33) 3133-8595, Importado y Distribuido en El Salvador por: COVESA, S.A. DE CV.

Adler

www.adler-la.com