

Adbendal 10% Co-Se

Ficha técnica

No. DE REGISTRO Q-0970-035 USO VETERINARIO Suspensión oral

Fórmula



Cada 100 mL contiene:

Albendazole.....	10 g
Sulfato de cobalto.....	1.5 g
Selenito de sodio.....	250 mg
Vehículo c.b.p.....	100 mL

Indicaciones



Adbendal 10% Co-Se está indicado para el control y tratamiento de las parasitosis internas en bovinos (leche y carne), ovinos y caprinos, causada por gusanos redondos gastrointestinales (*Haemonchus* spp., *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Oesophagostomum* spp., *Chabertia*, *Bunostomum phlebotomum*, *Strongyloides*, etc.). Parásitos pulmonares (*Dictyocaulus viviparus*), tenias (*Moniezia* spp.). De igual manera, ataca parásitos del hígado (*Fasciola hepática*). Adbendal 10% Co-Se, actúa eficazmente contra parásitos adultos, huevecillos y larvas de los gusanos pulmonares y tenias del ganado bovino. Además de combatir estas parasitosis Adbendal 10% Co-Se, contiene selenio y cobalto. El selenio ayuda en los casos de ganado con bajo crecimiento, pelaje pobre, rigidez muscular y diarreas que no responden a terapias con antibióticos, además de incrementar la fertilidad y la ganancia de peso. El cobalto es un elemento que actúa en la síntesis de vitamina B₁₂, interviene también en el mantenimiento de la flora ruminal. Por su parte el cobalto, está recomendado en casos de anorexia, pérdida de peso, debilidad, anemia y baja en la producción de leche.

Dosis



Bovinos (carne y leche), ovinos y caprinos:

Aplicar 1 mL por cada 10 kg de peso vivo (equivalente a 10 mg de albendazol, 1.5 mg de sulfato de cobalto y 0.25 mg de selenio de sodio por kg de peso), en dosis única a criterio del Médico Veterinario.

Peso del animal kg	Gusanos redondos gastrointestinales, tenias, gusanos pulmonares y <i>Fasciola hepática</i>
10	1 mL
20	2 mL
50	5 mL
100	10 mL
200	20 mL
300	30 mL
400	40 mL
500	50 mL

Vía de administración



Oral.



Advertencias



Agitar antes de usarse. Al igual que cualquier fármaco pueda presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. No exceder de la dosis recomendada contra *Fasciola hepática*. No administrar el producto en caso de tener una dieta muy alta en selenio y/o cobalto. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Tiempo de retiro



No utilizar para consumo humano la carne de animales tratados hasta 30 días después de la última aplicación en bovinos y 7 días en ovinos y caprinos. No utilizar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 3 días después de la última aplicación en bovinos y en ovinos y caprinos 4 días.

Almacenamiento



Consérvese en un lugar fresco y seco. Protéjase de la luz solar directa. Deseche el envase por medio de la incineración. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Presentaciones



Frasco de 250 mL, 1 y 5 Litros.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:
GT: MX542-42-10-14936 NI: MV-14151 PA: SV: HN:
® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.
Tel: (33) 3133-8595.

Adler

www.adler-la.com