

ADELev 12%

No. DE REGISTRO Q-0970-037 USO VETERINARIO Solución inyectable

Ficha técnica

Fórmula



Cada 100 mL contienen:

Levamisol clorhidrato.....	12 g
Vitamina A	10'000,000 UI
Vitamina D ₃	1'500,000 UI
Vitamina E	1,000 UI
Vehículo c.b.p.	100 mL

Mecanismo de acción



En los nemátodos estimula las estructuras ganglionares produciendo contracción y relajación muscular seguida de parálisis neuromuscular, para finalmente ser expulsados del intestino.

Indicaciones



ADELev 12% antiparasitario de amplio espectro con vitaminas A, D₃ y E para desparasitar bovinos, ovinos y caprinos en una sola aplicación. Contra parásitos gastrointestinales y pulmonares, concentrado y vitaminado para contrarrestar las deficiencias vitamínicas originadas por los parásitos y por la baja calidad de la pastura.

BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS



Haemonchus contortus
Trichostrongylus axei
Trichostrongylus spp.
T. colubriformis
Chabertia spp.
Strongyloides spp.
Capillaria spp.
Dictyocaulus viviparus
Ostertagia spp.
Nematodirus spp.
Cooperia spp.
Oesophagostomum spp.
Bunostomum spp.
Trichuris spp.
Toxocara vitulorum

Dosis



ESPECIE	kg	DOSIS
	450	18.75 - 30 mL
	300	12.5 - 20 mL
	30	1.8 mL

Bovinos (carne y leche): 5 a 8 mg de Levamisol por kg de peso corporal (equivalente a 1 mL/15 - 24 Kg de peso corporal). Ovinos y caprinos: 7.5 mg de Levamisol por kg de peso corporal (equivalente a 1 mL/16 kg de peso corporal). Es posible repetir la dosis a criterio del Médico Veterinario.



Vía de administración



Intramuscular profunda.

Advertencias



No usar en equinos y caninos. No administrar por vía intravenosa. La aplicación intramuscular de levamisol puede ocasionar dolor e hinchazón en el sitio de inyección el cual usualmente desaparece de 7 a 14 días. Dosificar siempre en relación al peso. Se debe utilizar cuidadosamente en animales muy débiles o si existe daño hepático. No administrar más de 10 mL por sitio de aplicación. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Tiempo de retiro



No deberá usar este producto 3 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano. No usar para consumo la leche de vacas tratadas con este producto hasta 72 horas después de la última aplicación.

Almacenamiento



Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 a 30 °C. Protéjase de la luz solar directa. Deseche por medio de la incineración. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Presentaciones



Frascos de 20, 100 y 500 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:
NI: MV-10853, PA: RF-B341-18, SV: HN: MV-1-4861
© Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.
Tel: (33) 3133-8595.

Adler

www.adler-la.com