

Advac Newcastle

Ficha técnica

No. DE REGISTRO B-0970-007 USO VETERINARIO Solución inyectable

Fórmula



Cada 1 mL contiene:

Virus activo de la enfermedad de Newcastle cepa La Sota, obtenido en embrión de pollo SPF 1×10^7 DIEP₅₀

Diluyente adjunto: Agua inyectable estéril

Indicaciones



Vacuna indicada para la inmunización activa contra la enfermedad de Newcastle en aves domésticas (*Gallus gallus domesticus*), dedicadas a la producción de carne, huevo, reproductoras y de combate.

Dosis



Vía ocular o nasal: 1 gota por ave.

Vía oral en el agua de bebida: 1 mL/litro de agua por cada 25 aves.

Se recomienda aplicar en las aves domésticas (*Gallus gallus domesticus*), desde la 1ra. a 2da. semana de edad y aplicar un refuerzo a la 3ra. a 6ta. semana después. La frecuencia de revacunación será cada 3 a 4 meses según la zona o incidencia de la enfermedad.

Vía de administración



Ocular, nasal u oral en agua de bebida.

Modo de preparación



Agregar el diluyente adjunto de agua inyectable estéril, al vial con la pastilla liofilizada y mezclar perfectamente.

Vía ocular y/o nasal: una vez reconstituida la vacuna, colocar el aplicador en el vial con la mezcla preparada. Aplicar una gota por ave en el orificio nasal u ocular.

Dosificación vía oral en el agua de bebida: una vez reconstituida la vacuna, extraer y vaciar en el agua de bebida requerida de acuerdo al número de aves a inmunizar.

El agua de bebida, deberá estar limpia y libre de cloro; los recipientes deberán estar limpios (no utilizar desinfectantes).

Se recomienda como manejo de las aves a vacunar, suspender la administración del agua de bebida en las primeras horas de la mañana (1.5 a 2 horas). Las aves se encontrarán sedientas y beberán rápidamente la vacuna preparada.

Técnica de aplicación

PASO


1 Agregar el agua inyectable estéril, al vial con la pastilla liofilizada y mezclar perfectamente.

PASO

2 Colocar el aplicador en el vial con la mezcla preparada.

PASO

3 1 gota por Ave.



Advertencias



La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina. Aplíquese únicamente en aves sanas. Una vez reconstituida debe aplicarse inmediatamente todo el contenido. El virus del Newcastle puede producir conjuntivitis en el humano por 2 o 3 días; evite tocarse los ojos cuando trabaje con esta vacuna. Lávese las manos después de su preparación. El manejo o administración inadecuada puede causar modificaciones en los resultados esperados. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Tiempo de retiro



No utilizar este producto 21 días antes del sacrificio de las aves destinadas para consumo humano.

Almacenamiento



Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C. Evítese la congelación y exposición a la luz solar directa. Deseche el frasco y sobrante mediante la incineración. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Presentaciones



Frasco de 1 mL (25 dosis), 2 mL (50 dosis), 4 mL (100 dosis) y 40 mL (1,000 dosis) más diluyente adjunto.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:
GT: MX542-65-63-13453, NI: MV-11337, PA: RB-700-19, SV: VE2019055573, HN: MV-2-881
® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V. Crisantemo No. 12,
Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México, Tel: (33) 3133-8595.
Importado y Distribuido en El Salvador por: COVESA, S.A. de C.V.

Adler

www.adler-la.com