Calciler MAX

Ficha técnica

No. DE REGISTRO Q-0970-041 **USO VETERINARIO** Solución inyectable

Fórmula

Cada 100 mL contienen:

Gluconato de calcio	26 g
Dextrosa anhídra	8 g
Ácido bórico	5.2 g
Hipofosfito de magnesio	1.46 g
Nicotinamida (Vit. B3)	100 mg
Tiamina (Vit. B1)	24 mg
Piridoxina (Vit. B6)	20 mg
Riboflavina (Vit. B2)	12 mg
DL- isoleucina	8 mg
L-Arginina HCL	8 mg
L- Histidina HLC	5.6 mg
L-metionina	4.8 mg
D-pantenol	1.2 mg
Vehículo c.b.p.	100 mL

Indicaciones

Está indicado para el tratamiento y la profilaxis de los trastornos metabólicos del calcio y minerales, que afectan a:

Bovinos (carne y leche): raquitismo, hipocalcemia (fiebre de leche), tetania de los pastos, estados de estrés, acetonemia (toxemia de la preñez), osteomalacia y calambres.

Equinos no destinados para consumo humano: raquitismo, hipocalcemia (tetania hipocalcemia), tetania de los pastos, estados de estrés y calambres.

Ovinos (carne): raquitismo, hipocalcemia (fiebre de leche), acetonemia (toxemia de la preñez), tetania de los pastos, estados de estrés y calambres.

Caprinos (carne y leche): raquitismo, hipocalcemia (fiebre de leche), acetonemia (toxemia de la preñez) tetania de los pastos, estados de estrés y calambres.

Caninos: raquitismo, hipocalcemia (tetania puerperal, Eclampsia), osteomalacia y calambres.

Dosis

Bovinos (carne y leche) **y equinos:**
200 a 500 mL

Ovinos (carne) **y caprinos** (carne y leche)**:**
15 a 30 mL

Caninos:
5 a 10 mL

Vía de administración

Intravenosa lenta, intramuscular profunda o subcutánea.

Advertencias

Por vía intravenosa, deberá administrarse lentamente 100 mL (15 a 20 minutos). La dosis puede ser dividida, una mitad por vía IV y la otra mitad por vía IM o SC Todas las sales por vía IV pueden favorecer la presencia de shock o bloqueo cardiaco, en particular en el caballo; use la vía IM en soluciones más diluidas, caliente el producto a la temperatura corporal. No administrar en combinación con sulfas. Revise la frecuencia cardiaca antes de la aplicación, 70 por minuto como máximo durante la aplicación de cualquier calcio. En caso de presentarse arritmia cardiaca, sudación, lagrimeo, polipnea y espasmos musculares, suspenda inmediatamente la aplicación y continúe posteriormente en forma más lenta cuando el animal haya recuperado la normalidad de sus constantes fisiológicas.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Almacenamiento

Consérvese en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre 15 y 30 °C.
Protéjase de la luz solar directa.
Deseche por medio de la incineración.
Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Presentaciones

Frasco de 500 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:
GT: MX542-07-05-9262 NI: MV-11982 PA: RF-8651-19 SV: HN: MV-1-4860
® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.
Tel: (33) 3133-8595.

Adler www.adler-la.com