Flupenil 4M

Ficha técnica

No. DE REGISTRO Q-0970-013 **USO VETERINARIO** Polvo estéril para suspensión inyectable

Fórmula

Frasco con polvo estéril:
Penicilina G Procaína..... 4 MUI
Estreptomicina sulfato..... 4 g
Flumetasona..... 0.00125 g

Frasco con diluyente estéril:
Agua destilada grado farmacéutico ..... 20 mL

Hecha la mezcla cada mL contiene:
Penicilina G Procaína..... 200,000 UI
Estreptomicina sulfato..... 200 mg
Flumetasona..... 0.0625 mg

Mecanismo de acción

Las penicilinas inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana y la estreptomicina inhibe la síntesis proteica bacteriana a nivel de la subunidad 30S ribosomal.
La flumetasona se difunde a través de las membranas celulares y forman complejos con receptores citoplasmáticos específicos, después de estos complejos que generan efectos glucocorticoides disminuyendo o previniendo las respuestas del tejido a los procesos inflamatorios.

Indicaciones

Está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas complicadas con procesos inflamatorios causados por microorganismos sensibles a la combinación de la penicilina y estreptomicina como son: *Estreptococos, Neumococos, Estafilococos, Corynebacterium, Pasteurella, Haemophilus, Klebsiella y Listeria.* Esta combinación antibiótica con desinflamatorio tiene valor terapéutico en afecciones del sistema respiratorio, órganos urogenitales, glándula mamaria, sistema muscular, sistema gastrointestinal, infecciones septicémicas y en aquellas asociadas a heridas quirúrgicas o traumáticas en bovinos (carne y leche), equinos (no destinados al consumo humano), ovinos (carne), caprinos (carne y leche), caninos y felinos.

MICROORGANISMOS SENSIBLES A LA FÓRMULA COMO SON:

Staphylococcus aureus	*Streptococcus agalactiae*
Diplococcus	*Streptococcus dysgalactiae*
Bacteroides	*Streptococcus uberis*
Clostridium spp	*Streptococcus zooepidemicus*
Streptococcus pneumoniae	*Actinomyces*
Corynebacterium pyogenes	*Listeria*
Corynebacterium bovis	*Pasteurella multocida*
Bacillus anthracis	*Leptospira*

Causantes de las siguientes infecciones:

Clostridiasis	Pasteurelosis
Abscesos	Neumonías
Heridas traumáticas	Metritis
Septicemia	Síndrome MMA
Piometra	Laminitis
Mastitis	

Dosis

1 a 2 mL/20 kg de peso corporal (equivale a 10,000 a 20,000 UI de Penicilina G Procaína por kg de peso; 10 a 20 mg de Estreptomicina por kg y 0.00625 mg de Flumetasona por kg de peso corporal), cada 24 h durante 3 a 7 días, a criterio del Médico Veterinario.

ESPECIE	kg	DOSIS
	400	20 mL
	450	22.5 mL
	300	15 mL
	30	1.5 mL
	30	1.5 mL
	4	0.20 mL

Vía de administración

Intramuscular profunda.

Advertencias

Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. No administrar conjuntamente sulfas sódicas. No mezclar con barbitúricos y gluconato de calcio o bicarbonato de sodio. No administrar en animales con insuficiencia renal. No utilizar en hembras gestantes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No utilizar este producto en equinos destinados para consumo humano.

Tiempo de retiro

No usar la leche procedente de animales tratados hasta 72 horas posteriores a la última aplicación para consumo humano.
No utilizar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

Almacenamiento

Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 y 30 °C.
Protéjase de la luz solar directa.

Registros sanitarios:
GT: MX542-07-01-10133 NI: MV-12030 PA: SV: HN: MV-1-6252
® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.
Tel: (33) 3133-8595.

Adler www.adler-la.com

Flupenil 4M

Ficha técnica

No. DE REGISTRO Q-0970-013 **USO VETERINARIO** Polvo estéril para suspensión inyectable

Almacenamiento

Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 y 30 °C.
Protéjase de la luz solar directa.
Una vez hecha la mezcla, conserve en refrigeración entre 2 y 8 °C, durante 7 días.
Deseche por medio de la incineración.
Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Presentaciones

Frasco con polvo estéril 4 MUI más frasco con diluyente estéril de 20 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:
GT: MX542-07-01-10133 NI: MV-12030 PA: SV: HN: MV-1-6252
® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.
Tel: (33) 3133-8595.

Adler® www.adler-la.com