

# Ganaler Forte

Ficha técnica

No. DE REGISTRO Q-0970-030 USO VETERINARIO Polvo para reconstituir suspensión inyectable

## Fórmula



El frasco con polvo contiene:

Diaceturato de 4-4 diazoaminodibenzamida..... 1.5 g  
Oxitetraciclina base..... 4.0 g  
Cianocobalamina (Vit. B12)..... 1,000 mcg

El frasco con diluyente contiene:

Dipirona sódica..... 7 g  
Vehículo c.b.p..... 25 mL

## Mecanismo de acción



Interfiere en la síntesis de DNA del protozoario tanto a nivel del núcleo, como de los quinoplastos a través del diaceturato de diminazeno. La oxitetraciclina inhibe la síntesis proteica.

## Indicaciones






Ganaler Forte es una combinación de diferentes activos que actúan contra la Babesiosis (Piroplasma), anaplasma y tripanosomiasis; además de estimular el apetito, la formación de glóbulos rojos; así como disminuir el dolor, espasmos y fiebre que afectan a los bovinos, ovinos y caprinos.

## Dosis



1 mL por cada 20 kg de peso.

ESPECIE	kg	mL
	450	22.5
	300	15
	30	1.5

Cada 24 horas, durante 2 a 3 días a consideración del Médico Veterinario.

## Vía de administración



Intramuscular.

## Advertencias



Reconstituya con el diluyente adjunto y agítese perfectamente antes de administrarse. No administrar por vía intravenosa. Una vez hecha la mezcla, la suspensión presenta color amarillento que puede variar. No administrar a pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Evite la administración en conjunto con drogas hepatotóxicas o nefrotóxicas. Administre con precaución en animales con disfunción hepática o renal. En caso de salivación, secreción nasal y vómito, antídoto: Atropina. Puede presentar dolor en el sitio de aplicación. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



## Tiempo de retiro



No usar este producto 21 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano. No utilizar la leche para consumo o para la fabricación de derivados lácteos hasta 72 horas después de la última aplicación.

## Almacenamiento



Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 y 30 °C. Protéjase de la luz solar directa. Deseche por medio de la incineración. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

## Presentaciones



Frascos con polvo más diluyente adjunto para reconstituir suspensión inyectable de 25 mL.

Registros sanitarios:  
GT: MX542-42-08-7761 NI: MV-10852 PA: RF-8334-18 SV: HN: MV-1-4841  
® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.  
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.  
Tel: (33) 3133-8595.

Adler

www.adler-la.com