

### Fórmula



Cada 1 mL contiene:

Gentamicina.....	12 mg
Sulfametoxazol.....	100 mg
Trimetoprim.....	20 mg
Loperamida.....	0.5 mg
Vehículo (Caolin Pectina) c.b.p.....	1 mL

### Indicaciones



Antidiarreico y antimicrobiano de amplio espectro útil en infecciones causadas por microorganismos Gram positivos, Gram negativos como: *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp., *Klebsiella* spp., *Pseudomona* spp., *Proteus* spp., *Campylobacter* spp., *Vibrio* spp., *Treponema* spp., y *Clostridium* spp., así como en algunas infecciones por protozoarios: *Trichomonas*, *Isoospora* y *Eimeria*, *Mycoplasma* y *Rickettsias* sensibles a la acción de la fórmula. Empleado específicamente como adyuvante para el tratamiento de diversas diarreas tales como: mecánicas, virales y bacterianas agudas, y en los casos que se desee disminuir la motilidad intestinal de los mismos.

### Especie



Bovinos (carne y leche), ovinos, caprinos (carne y leche), caninos y felinos.

### Dosis



Bovinos (carne y leche), ovinos, caprinos (carne y leche) y caninos: 1 mL por cada 5 kg de peso corporal, cada 12 horas (equivalente a Gentamicina 2.4 mg/kg de peso corporal, Sulfametoxazol 20 mg/kg de peso corporal, Trimetoprim 4 mg/kg de peso corporal y Loperamida 0.1 mg/kg de peso corporal). Felinos: 0.5 mL por cada 5 kg de peso corporal cada 12 horas (equivalente a Gentamicina 1.2 mg/kg de peso corporal, Sulfametoxazol 10 mg/kg de peso corporal, Trimetoprim 2 mg/kg de peso corporal y Loperamida 0.05 mg/kg de peso corporal).

### Vía de administración



Oral.

### Advertencias



Todos los opioides como la loperamida deben ser empleados con precaución en pacientes con hipotiroidismo, insuficiencia renal, síndrome de Addison, geriátricos o débiles, con glaucoma, o con diarrea secundaria ocasionada por toxinas y/o *Salmonella* spp., obstrucción intestinal, o traumatismo abdominal. También son contraindicados en casos donde el paciente es hipersensible a los analgésicos narcóticos o que estén en tratamiento con inhibidores de la aminooxidasa. Debe emplearse con precaución en pacientes con lesiones en la cabeza o con aumento de la presión, enfermedades respiratorias y/o con problemas hepáticos. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



### Tiempo de retiro



Carne: Bovinos, ovinos y caprinos: 10 días. Leche: Bovinos, ovinos y caprinos: 7 días.

### Almacenamiento



Consérvese en un lugar fresco y seco. Protéjase de la luz solar directa. Deseche por medio de la incineración. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

### Presentaciones



Frasco de 60, 100 y 250 mL.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA  
INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO**