



Fórmula



Cada 100 mL contienen:
 Penicilina G (Procaína*) equivalente a..... 20 MUI
 Dihidroestreptomicina (sulfato)..... 20 g
 Vehículo c.b.p..... 100 mL
 *Factor H3

Mecanismo de acción



La Penicilina Procaínica es un potente antibiótico de la familia de los betalactámicos que actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana a través de la interferencia sobre la enzima transpeptidasa.

La Dihidroestreptomicina es antibiótico aminogluósido bactericida, actúa sobre la subunidad ribosómica 30s produciendo interferencia sobre la síntesis proteica bacteriana.

Factor H3 molécula conjugada con la Penicilina; es un compuesto conformado por dos sustancias vitamínicas del grupo B: *PABA y **DEAE, que al ingresar al organismo sufre el fenómeno de hidrólisis, separándose ambas sustancias en forma ionizada. Haciendo su absorción más fácilmente y de esta manera genera una acción analgésica, disminuyendo el estrés del animal y permitiendo una mejor acción antibiótica del producto.

*PABA: Ácido Paraaminobenzoico. **DEAE: Dietilaminoetanol.

Indicaciones



Prozahn GH3 está indicado en el tratamiento de procesos infecciosos agudos o crónicos como: Mastitis, Gabarros, Metritis, Fiebre de embarque, Neumonías y otras infecciones producidas por microorganismos sensibles a los componentes de la fórmula que afectan a bovinos, equinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

Dosis



Bovinos (carne y leche), equinos, ovinos y caprinos: 1 mL/10 a 20 kg de peso corporal (10,000 a 20,000 UI), cada 12 -24 horas, durante 3-5 días.
 Caninos: 0.5 a 4 mL (20,000 a 35,000 UI), cada 12 -24 horas, durante 3-5 días.
 Felinos: 0.5 a 1 mL (20,000 a 35,000 UI), cada 12 -24 horas, durante 3-5 días. A criterio del Médico Veterinario.

Felinos 0.5 a 1 mL		20,000 a 35,000 UI	Cada 12 -24 horas, durante 3-5 días.
Caninos 0.5 a 4 mL		20,000 a 35,000 UI	Cada 12 -24 horas, durante 3-5 días.
Especie 1 mL	   	10 a 20 kg de peso corporal (10,000 a 20,000 UI)	Cada 12-24 horas, durante 3-5 días.

Vía de administración



Intramuscular profunda.

Advertencias



Agítese antes de usarse. No aplicar por vía intravenosa. No administrar animales con insuficiencia renal, hepatopatías, cardiopatías o lesiones cocleovestibulares. No administrar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Se recomienda realizar una prueba de sensibilidad cutánea, previa a la aplicación de medicamentos con penicilina. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Tiempo de retiro



No usar este producto 18 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano. No consumir la leche de animales tratados hasta 6 ordeñas después del último tratamiento. No utilizar este producto en equinos destinados al consumo humano.

Almacenamiento



Almacenar a temperatura ambiente no excediendo 25 °C. Una vez que el frasco ha sido abierto mantener en refrigeración entre 2 y 8 °C, el contenido debe ser usado en los próximos 28 días. Deseche por medio de la incineración. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Presentaciones



Frasco de 30, 100 y 250 mL.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
 SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
 INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO**

Registros sanitarios:
 GT: MX542-07-01-5081 NI: MV-10274 PA: RF-7627-16 SV: VE2018015403 HN: MV-1-5669
 © Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
 Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.
 Tel: (33) 3133-8595. Importado y Distribuido en El Salvador por: COVESA S.A. de C.V.