

# Trimeler 24

Ficha técnica

No. DE REGISTRO Q-0970-043 USO VETERINARIO Solución inyectable

## Fórmula



Cada 100 mL contienen:

Sulfametoxazol..... 20 g  
Trimetoprim ..... 4 g  
Vehículo c.b.p. .... 100 mL

## Mecanismo de acción



Las sulfamidas son antimetabolitos, esto es, interfieren la producción normal de RNA, la síntesis de proteína y los mecanismos de replicación microbiana. Las sulfamidas inhiben el metabolismo intermedio al interferir la producción de ácido fólico, mientras que las diaminopirimidinas (Trimetoprim) interfieren pasos posteriores de esta cascada metabólica deteniendo la producción de ácido tetrahidrofólico. Al bloquear estos pasos para el metabolismo del ácido fólico la combinación llega a ser bactericida.

## Indicaciones



Trimeler 24 está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas agudas y crónicas que afectan al aparato respiratorio, digestivo, genitourinario y dermatológico causadas por bacterias como: *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *E. coli*, *Actinomyces* spp., *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Klebsiella* spp., *Listeria monocytogenes*, *Salmonella* spp., *Proteus mirabilis*, *Pasteurella* spp., *Enterobacter aerogenes*, *Haemophilus influenzae* y *Corynebacterium* spp., algunos hongos (*Chlamydia*, *actinomicetos*); y coccidias (*Eimeria* spp., *Isospora* spp.), que afecta a los bovinos (carne y leche), equinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

## PADECIMIENTO PROCESO INFECCIOSO

RESPIRATORIO	Neumonías bacterianas, pasteurelosis, bronquitis, adenitis, rinitis, influenza viral.
DIGESTIVO	Salmonelosis, colibacilosis, enteritis aguda y crónica, coccidiosis.
GENITOURINARIO	Pielonefritis, metritis, mastitis, prostatitis.
PIEL	Gabarro, onfalitis, heridas, nocardiosis.
CIRCULATORIO	Septicemia.

## Dosis



Administrar 1 mL/15 kg de peso corporal (equivalente a 2.7 mg/kg de Trimetoprim y 13.3 mg/kg de Sulfametoxazol) Cada 24 h durante 5 a 7 días.

## Vía de administración



ESPECIE	DOSIS/VÍA DE ADMINISTRACIÓN	FRECUENCIA
Felinos y Caninos 	1 mL/15 kg de peso corporal Intravenosa lenta* o Intramuscular  *Administrar muy lentamente	Cada 24 horas, durante 3 a 5 días.
*Bovinos (carne y leche). 	1 mL/15 kg de peso corporal Intravenosa lenta*, Intramuscular o subcutánea.	Cada 24 horas, durante 3 a 5 días.
Equinos no destinados para el consumo humano 	1 mL/15 kg de peso corporal Intravenosa lenta*, Intramuscular.	Cada 24 horas, durante 3 a 5 días.

\*La administración por vía intravenosa debe ser lenta a temperatura corporal. Las diluciones con Dextrosa al 5%: 5 mL de TRIMELER 24 en 75 o 125 mL de Dextrosa al 5%, se debe administrar dentro de 2 o 6 horas. La solución no debe utilizarse si está turbio o contiene un precipitado. La solución intravenosa no se debe mezclar con otros medicamentos o soluciones.



## Advertencias



No administrar en animales con hipersensibilidad a las sulfamidas. Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Antídoto: antihistamínico. Incrementar el consumo de agua durante el tratamiento. No utilizar en animales con insuficiencia renal. En caninos puede presentar queratoconjuntivitis seca en tratamientos prolongados. Las diluciones intravenosas con dextrosa al 5% se deben administrar dentro de 2 o 6 horas. La solución no debe utilizarse si está turbio o contiene un precipitado. La solución intravenosa no se debe mezclar con otros medicamentos o soluciones.

## Tiempo de retiro



No usar este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. No usar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 5 días después de la última aplicación. No usar este producto en equinos destinados para consumo humano.

## Almacenamiento



Consérvese en un lugar fresco y seco, entre 15 y 30 °C. Protéjase de la luz solar directa. La cristalización del producto por bajas temperaturas puede ser revertida mediante un calentamiento suave. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Deseche por medio de la incineración. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

## Presentaciones



Frascos de 30 y 100 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA  
INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:  
GT: MX542-07-01-7759 , NI: MV-10165, PA: RF-7497-15, SV:, HN: MV-1-5143  
® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.  
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.  
Tel: (33) 3133-8595.

Adler

www.adler-la.com