

Fórmula



Cada 100 mL contiene:
 Ivermectina..... 3.15 g
 Vehículo c.b.p..... 100 mL

Mecanismo de acción



La ivermectina favorece la liberación de ácido gamma-aminobutírico (GABA) en las neuronas presinápticas. El GABA actúa como un neurotransmisor inhibitorio y bloquea la estimulación postsináptica de la neurona adyacente en los nematodos o en las fibras musculares de los artrópodos. Por medio de la estimulación de la liberación del GABA, la ivermectina causa la parálisis del parásito y su eventual muerte.

Indicaciones



Adecto 3.15% está indicado para el tratamiento de parásitos internos y externos en bovinos (carne), ovinos y caprinos (carne):

Endoparásitos	Género
Nematodos gastrointestinales	<i>Ostertagia ostertagi</i> <i>Haemonchus placei</i> <i>H. contortus</i> <i>Trichostrongylus axei</i> <i>T. colubriformis</i> <i>Cooperia oncophora</i> <i>C. punctata</i> <i>C. pectinata</i> <i>Oesophagostomum radiatum</i> <i>Bunostomum phlebotomum</i> <i>Strongyloides papillosus</i> <i>Trichuris ovis</i>
Nematodos pulmonares	<i>Dictyocaulus viviparus</i>
Ectoparásitos	Género
Piojos	<i>Linognathus vituli</i> <i>Haematopinus eurysternus</i> <i>Saroptes capillatus</i> <i>Chorioptes spp.</i>
Acaros de la sarna	<i>Psoroptes spp.</i> <i>Sarcoptes scabiei</i>

Dosis



Bovinos (carne), ovinos y caprinos (carne): 1 mL por cada 50 kg de peso corporal (equivalente a 630 µg de ivermectina por kg de peso corporal), en dosis única.
 La dosis y periodo pueden variar a criterio del Médico Veterinario.

Vía de administración



Subcutánea exclusivamente.



Advertencias



No aplicar este producto por vía intravenosa o intramuscular. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No aplicar mas de 10 ml en el mismo sitio de aplicación. No utilizar este producto para controlar infecciones de garrapata *Boophilus* spp.

Tiempo de retiro



No se administre este producto 122 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No usar en ganado productor de leche para consumo humano.

Almacenamiento



Consérvese en un lugar fresco y seco. Protéjase de la luz solar directa. Deseche por medio de la incineración. Debido a la toxicidad que representa la ivermectina a los organismos acuáticos, los envases y sus residuos deberán desecharse en forma segura incinerándolos y/o enterrándolos. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Presentaciones



Frasco de 100 y 500 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
 SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
 INFORMACIÓN TÉCNICA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:
 GT: NI: PA: SV: HN:
 © Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V. Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel: (33) 3133-8595