

Admicin 5%

Ficha técnica

No. DE REGISTRO Q-0970-014 USO VETERINARIO Solución inyectable

Fórmula



Cada 1 mL contiene:

Oxitetraciclina base..... 50 mg
Vehículo c.b.p..... 1 mL

Mecanismo de acción



Interfieren en la síntesis proteica y por tanto en el crecimiento y multiplicación de las bacterias. Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro.

Indicaciones



ADMICIN 5% es un antibiótico indicado en infecciones causadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas, Micoplasma y Rickettsias, sensibles a la fórmula, causantes de enfermedades como: anaplasmosis, neumonías bacterianas, pasteurelosis, mastitis, metritis, diarreas, leptospirosis, clostridiasis, artritis infecciosa, actinobacilosis, ántrax, listeriosis y micoplasmosis que afectan a los bovinos (carne y leche), equinos no destinados para consumo humano, ovinos, caprinos; en caninos y felinos para neumonía, bronquitis, pleuresía, peritonitis y como terapia de apoyo en moquillo canino.

Dosis



Bovinos (carne y leche), equinos no destinados para consumo humano, ovinos y caprinos: 1 a 2 mL/10 kg de peso corporal (equivalente a 5 - 10 mg de oxitetraciclina por kilogramo de peso corporal), cada 12 a 24 horas, durante 3 a 5 días.

Caninos y felinos: 1 mL/5 kg (equivalente a 2.5 mg de oxitetraciclina por kilogramo de peso corporal), cada 12 horas, durante 3 a 5 días.

Vía de administración



Intramuscular profunda.

Advertencias



Después de la administración intramuscular puede provocar reacción local, con una coloración amarillenta. Contraindicado en animales hipersensibles a la fórmula. No aplicar en animales en crecimiento. No aplicar más de 15 mL en un solo sitio de inyección. En ovinos y caprinos: no aplicar más de 5 mL en un solo sitio de aplicación. No administrar durante la primera mitad de la gestación, ya que afecta el desarrollo dental ocasionando pigmentación permanente de los dientes (amarillo, gris parduzco), así como alteraciones de desarrollo esquelético, debido a su acción quelante con el calcio. No combinar con otros antibióticos como amikacina, ampicilina sódica, glucocorticoides y Penicilina G. Su uso prolongado puede inducir el desarrollo de micosis por supresión de la flora normal. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Tiempo de retiro



No utilizar este producto 28 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No destinar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 96 horas después de la última aplicación. No utilizar en equinos destinados para el consumo humano.

Almacenamiento



Conserve el producto en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente no superior a 28 °C.

Protéjase de la luz solar directa.

Deseche por medio de la incineración.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Presentaciones



Frasco de 20, 100 y 500 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:

GT: MX542-07-01-6594 NI: MV-11060 PA: RF-6186-12 SV: HN: MV-1-6347

® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.

Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.

Tel: (33) 3133-8595.

Adler

www.adler-la.com