

# Admicin Plus 10%

## Ficha técnica

No. DE REGISTRO Q-0970-050 USO VETERINARIO Solución inyectable

### Fórmula



Cada 1 mL contiene:

Oxitetraciclina base..... 100 mg  
Vehículo c.b.p..... 1 mL

### Mecanismo de acción



Interfieren en la síntesis proteica y por tanto en el crecimiento y multiplicación de las bacterias. Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro.

### Indicaciones



Admicin Plus 10% es un antibiótico indicado en infecciones causadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas, Micoplasma y Rickettsias, sensibles a la fórmula, causantes de enfermedades como: anaplasmosis, neumonías bacterianas, pasteurelosis, mastitis, metritis, diarreas, leptospirosis, clostridiasis, artritis infecciosa, actinobacilosis, ántrax, listeriosis y micoplasmosis que afectan a los bovinos (leche y carne), ovinos y caprinos; en caninos y felinos para neumonía, bronquitis, pleuresía, peritonitis y como terapia de apoyo en moquillo canino.

### Dosis



Bovinos (carne y leche), ovinos y caprinos: 1 mL/20 kg de peso corporal (equivalente a 5 mg de oxitetraciclina por kg de peso corporal), cada 24 horas durante 3-5 días.

Caninos y felinos: 1 mL/10-20 kg de peso corporal (equivalente a 5-10 mg de oxitetraciclina por kg de peso corporal), cada 24 horas durante 3-5 días.

En caso de Anaplasmosis: 2 mL/10 kg de peso corporal (equivalente a 20 mg/kg de peso corporal) en bovinos (carne y leche), a criterio del Médico Veterinario.

### Vía de administración



Intramuscular profunda.

### Advertencias



Después de la administración intramuscular puede provocar reacción local, con una coloración amarillenta. Contraindicado en animales hipersensibles a la fórmula. No aplicar en animales en crecimiento. En bovinos: no aplicar más de 10 mL en un solo sitio de inyección. En ovinos y caprinos: no aplicar más de 5 mL en un solo sitio de aplicación. No administrar durante la primera mitad de la gestación, ya que afecta el desarrollo dental ocasionando pigmentación permanente de los dientes (amarillo, gris parduzco), así como alteraciones de desarrollo esquelético, debido a su acción quelante con el calcio. No combinar con otros antibióticos como amikacina, ampicilina sódica, glucocorticoides y Penicilina G. Su uso prolongado puede inducir el desarrollo de micosis por supresión de la flora normal. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



### Tiempo de retiro



No usar este producto 28 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. No usar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 96 horas después de la última aplicación.

### Almacenamiento



Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 y 30 °C. Protéjase de la luz solar directa. Deseche por medio de la incineración. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

### Presentaciones



Frasco de 20, 100 y 500 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA  
INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:  
GT: MX542-07-01-6744 NI: PA: RF-8337-18 SV: VE2018015396 HN: MV-1-5916  
® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.  
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.  
Importado y distribuido en El Salvador por: COVESA, S.A de C.V. Tel: (33) 3133-8595.