

Adecto

ADULTO
Tabletas

No. DE REGISTRO Q-0970-044 | USO VETERINARIO | Tabletas
Registros sanitarios: GT: MX542-42-10-10130 NI: MV-12028 PA: SV: HN: MV-1-5145



Fórmula

Cada tableta contiene:

Ivermectina	1 mg
Prazicuantel	50 mg
Pamoato de pirantel	150 mg
Fenbendazol	150 mg
Excipiente c.b.p.	1 tableta



Indicaciones

Indicado para el tratamiento y control de las parasitosis causadas por nemátodos, cestodos y protozoarios, en estados larvarios y huevos, que afectan a caninos y felinos.

Agentes

Cestodos: *Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Taenia taeniaeformis*, *Echinococcus granulosus*. **Nemátodos:** *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*. *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense*, *Ancylostoma tubaeforme*. *Dirofilaria immitis*. *Capillaria aerophila*, *Capillaria plica*, *Capillaria feliscati*, *Capillaria linearis*, *Capillaria hepatica*. *Aelurostrongylus abstrusus*. **Protozoario:** *Giardia spp.*



Dosis

Caninos y felinos: 1 tableta para 10 kg de peso corporal (equivalente a 100 mcg/kg de ivermectina, 5 mg/kg de Prazicuantel, 15 mg/kg de Pamoato de pirantel y 15 mg/kg de Fenbendazol).

Repetir a los 15 días para romper con el ciclo biológico del parásito. Para el control de Giardiasis se recomienda una toma cada 24 horas durante 2 o 3 días, a criterio del Médico Veterinario.



Vía de administración

Oral.



Presentaciones

Exhibidor con 16 carteras, con 4 tabletas cada una (64 tabletas).



Especie

Caninos y Felinos.



Almacenamiento

- Consérvase en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Debido a la toxicidad de las ivermectinas evite eliminar el empaque y los residuos en mantos acuíferos, deberán desecharse en forma segura, enterrándolos o incinerándolos.



Advertencias

- En ocasiones puede producir diarrea, depresión, incoordinación, salivación, temores musculares, debilidad muscular y vómito.
- Dosificar siempre con relación al peso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No utilizar en animales menores a un 1 kg de peso.
- No se recomienda su uso de en razas de perros susceptibles a los componentes de la fórmula como son: Collie, Border Collie, Antiguo Pastor Inglés, Pastor Alemán, Pastor Australiano, Pastor Australiano miniatura, Pastor de Shetland y Whippet de pelo largo por la mutación del gen MDR1 (Gen recesivo que permite que algunos medicamentos atraviesen la barrera hematoencefálica).
- No se administre en perros y gatos menores de 6 semanas de edad.



Período de caducidad

24 meses a partir de la fecha de elaboración.



USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO