

Adecto Pomada

No. DE REGISTRO Q-0970-027 | USO VETERINARIO | Pomada
Registros sanitarios: GT: MX542-43-02-17506 NI: MV-15588 PA: SV: HN:



Fórmula

Cada tableta contiene:

Ivermectina 100 mg
Azufre 20 mg
Excipiente c.b.p. 100 mg



Indicaciones

Adecto Pomada es un acaricida tópico indicado para el tratamiento de apoyo y control de la sarna en perros, causada por ácaros del género: *Sarcoptes scabiei* y *Demodex canis*.



Modo de uso

Utilice guantes de látex para la aplicación. Tome una pequeña cantidad de Adecto Pomada y frótelos sobre la superficie de la piel afectada, permitiendo dejar una pequeña capa sobre ésta. Evite contaminar el resto del producto usando un guante nuevo antes de la siguiente aplicación. Repita la dosis cada 7 días, a criterio del Médico Veterinario.



Vía de administración

Tópica.



Especie

Caninos.



Presentaciones

Fascos de 100 y 200 g.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Debido a la toxicidad de las ivermectinas evite eliminar el empaque y los residuos en mantos acuíferos, deberán desecharse en forma segura, enterrándolos o incinerándolos.

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO



Advertencias

- Evite aplicar este producto en más del 30% de la extensión corporal del animal.
- Evite la ingestión del producto y el contacto con los ojos, mucosas, las llagas abiertas y los cortes.
- Los propietarios deben lavarse las manos después de cada aplicación y/o usar guantes de látex cuando administran el producto.
- En caso de intoxicación aplique epinefrina y tratamiento signológico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- Este producto no está recomendado para la especie felina.
- No aplique este producto en cachorros menores de 3 meses de edad ni hembras lactantes.
- No se recomienda su uso en razas de perros susceptibles a los componentes de la fórmula como son: Collie, cruce de Collie, Antiguo pastor inglés, Pastor Australiano, Pastor australiano miniatura y Shetland, por la mutación del gen MDR1 (Gen recesivo que permite que algunos medicamentos atraviesen la barrera hematoencefálica).



Período de caducidad

24 meses a partir de la fecha de elaboración.

