

# Adecto Puppy 1%

No. DE REGISTRO Q-0970-006 | USO VETERINARIO | Solución inyectable  
Registros sanitarios: GT: MX542-104-02-6747 NI: MV-10848 PA: RF-8336-18 SV: HN: MV-1-5917



## Fórmula

### Cada tableta contiene:

Ivermectina ..... 10 mg  
Excipiente c.b.p. .... 1 mL



## Indicaciones

Indicado para el tratamiento de los parásitos internos: gusanos redondos (*nemátodos*); *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Dirofilaria immitis* (gusano del corazón en etapa microfilaria). Ayuda también en el control de la sarna.



## Dosis

Utilice guantes de látex para la aplicación. Tome una pequeña cantidad de Adecto Pomada y frótelo sobre la superficie de la piel afectada, permitiendo dejar una pequeña capa sobre ésta. Evite contaminar el resto del producto usando un guante nuevo antes de la siguiente aplicación. Repita la dosis cada 7 días, a criterio del Médico Veterinario.



## Vía de administración

Tópica.



## Especie

Caninos y Felinos.



## Presentaciones

Frasco de 10 mL.



## Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Por su toxicidad, una vez utilizado evite desecharlos en mantos acuíferos, incinere o entierre el envase o sobrantes.

### USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO



## Advertencias

- Dosificar siempre con relación al peso.
- No existe un antídoto específico: tratamiento sintomático y de sostén.
- Evitar la aplicación conjunta con medicamentos que causan depresión del sistema nervioso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



## Contraindicaciones

- No aplicar por vía intramuscular o intravenosa.
- No se recomienda su uso en razas de perros susceptibles a los componentes de la fórmula como son: Collie, cruce de Collie, Antiguo Pastor Inglés, Pastor Australiano, Pastor Australiano miniatura y Shetland, por la mutación del gen MDR1 (gen recesivo que permite que algunos medicamentos atraviesen la barrera hematoencefálica).
- No se administre en caninos y felinos menores de 6 semanas de edad para evitar reacciones adversas.



## Período de caducidad

24 meses a partir de la fecha de elaboración.

