

Advac Puppy Parvo

No. DE REGISTRO B-0970-018 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.

Registros sanitarios: GT: MX542-65-03-7011 NI: MV-9587 PA: RB-517-13 SV: VE2019055566 HN: MV-2-930



Fórmula

Cada dosis de 1 mL contiene:

Parvovirus canino tipo 2b (CPV-2) cepa Cornell 10^{3.0} DICT_{50%}.
Adsorbidas en hidróxido de aluminio.



Indicaciones

Advac Puppy Parvo está indicada para la inmunización contra el Parvovirus canino en cachorros desde las 6 semanas de edad.



Dosis

Aplicar 1 mL a partir de las 6 semanas de edad en adelante.



Modo de empleo

Tomar el contenido total del frasco y aplicarlo inmediatamente, previa antisepsia del sitio de aplicación.



Vía de administración

Intramuscular o subcutánea.



Especie

Caninos.



Duración de la inmunidad

Revacunar 14 días después o a criterio del Médico Veterinario. El número de revacunaciones se repetirá dependiendo de la incidencia en la zona y de la condición particular de cada animal o a criterio del Médico Veterinario. En cachorros cuya madre no fue inmunizada, se recomienda aplicar la primera dosis a partir de las 6ta semana de edad. Las hembras deberán ser inmunizadas antes de la gestación para que los anticuerpos maternos protejan a los cachorros a través del calostro.

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO



Presentaciones

Blíster con 24 dosis (1 mL cada uno).



Almacenamiento

- Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C.
- Evítese la congelación y la exposición a la luz solar directa
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas antídoto: epinefrina.
- Aplíquese en animales sanos y desparasitados.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

No administrar en animales enfermos.



Período de caducidad

18 meses a partir de su fecha de elaboración.

