

Advac Puppy Parvo Corona

No. DE REGISTRO B-0970-024 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.

Registros sanitarios: GT: MX542-65-03-7009 NI: MV-10840 PA: RB-611-15 SV: VE2018085453 HN: MV-2-928



Fórmula

Cada dosis de 1 mL contiene:

Parvovirus canino tipo 2b, cepa Cornell 10^{3.0} DITC_{50%}

Coronavirus canino CCV-TN 449 10^{3.0} DITC_{50%}

Adsorbidos en hidróxido de aluminio.



Indicaciones

Advac Puppy Parvo Corona está indicada para la vacunación de perros sanos para la prevención de la enteritis canina causada por el parvovirus y coronavirus canino.



Dosis

Aplicar 1 ml (1 dosis) a partir de 6 semanas de edad en adelante.



Modo de empleo

Tomar el contenido total del frasco y aplicarlo inmediatamente, previa antisepsia del sitio de aplicación.



Vía de administración

Intramuscular o subcutánea.



Especie

Caninos.



Duración de la inmunidad

Revacunar a las 2 o 3 semanas después, a criterio del Médico Veterinario. Tomar en consideración los anticuerpos maternos, los cuales pueden interferir con una buena inmunidad. Revacunar anualmente.

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO



Presentaciones

Blíster con 24 dosis (1 mL cada uno).



Almacenamiento

- Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C.
- Evítese la congelación y la exposición a la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina.
- Aplicarse únicamente en animales sanos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

No vacunar hembras gestantes a ninguna etapa de preñez.



Período de caducidad

18 meses a partir de su fecha de elaboración.

