

Advac Puppy Triple

No. DE REGISTRO B-0970-020 | USO VETERINARIO | Liofilizado más diluyente adjunto.
Registros sanitarios: GT: MX542-65-89-7010 NI: PA: RB-610-15 SV: HN: MV-2-931



Fórmula

Vacuna liofilizada a virus vivo de:

Distemper canino MTK110³⁰ TCID 50/mL
Adenovirus tipo 2 HTK2 10³⁰ TCID 50/mL
Atenuada en una línea celular estable de origen canino.

Diluyente:

Bacterina de *Leptospira canicola* y *Leptospira icterohaemorrhagiae*.



Indicaciones

Advac Puppy Triple, vacuna de virus atenuado indicado para la inmunización de perros sanos contra el Distemper canino, Adenovirus canino tipo 2, Hepatitis viral canina, combinada con una bacterina contra *Leptospira canicola* y *Leptospira icterohaemorrhagiae*.



Dosis

Aplicar 1 ml (1 dosis).



Vía de administración

Intramuscular y/o subcutánea.



Especie

Caninos.



Modo de preparación

Agregar el diluyente adjunto (cepa de *Leptospira*) al vial (liofilizado) y agitar suavemente para su disolución.



Almacenamiento

- Consérvase en refrigeración entre 2 y 8 °C.
- Evítese la congelación y la exposición a la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO



Duración de la inmunidad

Se recomienda aplicar como primera dosis a las 9 - 12 semanas de edad, revacunar a los 15 días posteriores. El número de revacunaciones dependerá del criterio del Médico Veterinario, así como de la incidencia de la zona, época del año y de la condición particular de cada animal. Las hembras deberán ser inmunizadas antes de la gestación para que los anticuerpos maternos resultantes protejan a los cachorros a través del calostro.



Presentaciones

Blíster con 12 dosis (1 mL cada uno).



Advertencias

- La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

No vacunar perras gestantes.



Período de caducidad

18 meses a partir de su fecha de elaboración.

