



Fórmula

Cada 1 mL contiene:

Gentamicina	12 mg
Sulfametoxazo	100 mg
Trimetoprim	20 mg
Loperamida	0.5 mg
Vehículo (Caolín, Pectina) c.b.p	1 mL



Indicaciones

Antidiarreico y antimicrobiano de amplio espectro útil en infecciones causadas por microorganismos Gram positivos, Gram negativos como: *Escherichia coli*, *Pasteurella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pseudomona spp.*, *Proteus spp.*, *Campylobacter spp.*, *Vibrio spp.*, *Treponema spp.*, y *Clostridium spp.*, así como en algunas infecciones por protozoarios: *Trichomonas*, *Isospora* y *Eimeria*, *Mycoplasma* y *Rickettsias* sensibles a la acción de la fórmula. Empleado específicamente como adyuvante para el tratamiento de diversas diarreas tales como: mecánicas virales y bacterianas, agudas y en los casos que se desee disminuir la motilidad intestinal de los mismos.



Dosis

Bovinos (carne y leche), Ovinos, Caprinos (carne y leche) y Caninos: 1 mL por cada 5 kg de peso corporal, cada 12 horas (equivalente a Gentamicina 2.4 mg/kg de peso corporal, Sulfametoxazol 20 mg/kg de peso corporal, Trimetoprim 4 mg/kg de peso corporal y Loperamida 0.1 mg/kg de peso corporal).
Felinos: 0.5 mL por cada 5 kg de peso corporal cada 12 horas (equivalente a Gentamicina 1.2 mg/kg de peso corporal, Sulfametoxazol 10 mg/kg de peso corporal, Trimetoprim 2 mg/kg de peso corporal y Loperamida 0.05 mg/kg de peso corporal).



Vía de administración

Oral.



Especie

Bovino (carne y leche), Ovinos, Caprinos (carne y leche) y Caninos y Felinos.



Presentaciones

60, 100 y 250 mL

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- Todos los opioides como la loperamida deben ser empleados con precaución en pacientes con hipotiroidismo, insuficiencia renal, síndrome de Addison, geriátricos o débiles, con glaucoma, o con diarrea secundaria ocasionada por toxinas y/o *Salmonella spp.*, obstrucción intestinal o traumatismo abdominal.
- Manténgase en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar directa.



Contraindicaciones

- También son contraindicados en casos donde el paciente es hipersensible a los analgésicos narcóticos o que estén en tratamiento con inhibidores de la aminooxidasa.
- Debe emplearse con precaución en pacientes con lesiones en la cabeza o con aumento de la presión, enfermedades respiratorias y/o con problemas hepáticos.



Tiempo de retiro

- Carne: Bovinos, Ovinos, Caprinos: 10 días.
- Leche: Bovinos, Ovinos y Caprinos: 7 días.



Período de caducidad

24 meses a partir de la fecha de elaboración.

