

Adbac 8 vías®

No. DE REGISTRO B-0970-013 | USO VETERINARIO | Suspensión inyectable.
Registros sanitarios: GT: MX542-64-421-14968 NI: PA: MV-010833 SV: HN: MV-21019



Fórmula

Cada 1 mL contiene:

<i>Clostridium chauvoei</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium septicum</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium novyi</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium sordellii</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium perfringens</i> tipo B	1.5 x 10 ⁸ UFC
<i>Clostridium perfringens</i> tipo C	1.5 x 10 ⁸ UFC
<i>Clostridium perfringens</i> tipo D	1.5 x 10 ⁸ UFC
<i>Pasteurella multocida</i>	3 x 10 ⁸ UFC
<i>Mannheimia haemolytica</i> serotipo A1	3 x 10 ⁸ UFC
<i>E. coli</i>	1 x 10 ⁹ UFC
Adsorbidos en hidróxido de aluminio	0.25%



Indicaciones

Adbac 8 vías está indicada para la prevención del carbón sintomático, edema maligno, hepatitis necrótica infecciosa, enterotoxemias, miositis, pasteurelisis, infecciones por *Mannheimia haemolytica* y *E. coli*.



Dosis

Bovinos: 5 mL. Ovinos y Caprinos: 2.5 mL.



Vía de administración

Intramuscular o subcutánea.



Especie

Bovinos, Ovinos y Caprinos.



Tiempo de retiro

- No administrar este producto 21 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.
- No hay periodo de retiro en leche.

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO



Presentaciones

50mL, 100mL, 250mL.



Almacenamiento

- Consérvese en refrigeración entre 4 a 8 °C.
- Evite la congelación y la exposición a la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- Agítase antes de usarse.
- Cuando se administre por primera vez, debe aplicarse un refuerzo 2 a 3 semanas después.
- La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina y/o antihistamínicos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

