

Adbendal 10% Co-Se

No. DE REGISTRO Q-0970-035 | USO VETERINARIO | Suspensión oral
Registros sanitarios: GT: MX542-42-10-14936 NI: MV-14151 PA: MV-9557 SV: HN: MV-07250



Fórmula

Cada 100 mL contiene:

Albendazole	10 g
Sulfato de cobalto	1.5 g
Selenito de sodio	250 mg
Vehículo c.b.p	100 mL



Indicaciones

Adbendal 10% CO-SE está indicado para el control y tratamiento de las parasitosis internas en bovinos (leche y carne), ovinos y caprinos, causada por gusanos redondos gastrointestinales (*Haemonchus spp.*, *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Chabertia*, *Bunostomum phlebotomum*, *Strongyloides*, etc.). Parásitos pulmonares (*Dictyocaulus viviparus*), tenias (*Moniezia spp.*). De igual manera, ataca parásitos del hígado (*Fasciola hepática*). Adbendal 10% CO-SE, actúa eficazmente contra parásitos adultos, huevecillos y larvas de los gusanos pulmonares y tenias del ganado bovino. Además de combatir estas parasitosis Adbendal 10% CO-SE, contiene selenio y cobalto. El selenio ayuda en los casos de ganado con bajo crecimiento, pelaje pobre, rigidez muscular y diarreas que no responden a terapias con antibióticos, además de incrementar la fertilidad y la ganancia de peso. El cobalto es un elemento que actúa en la síntesis de vitamina B12, interviene también en el mantenimiento de la flora ruminal. Por su parte el cobalto, está recomendado en casos de anorexia, pérdida de peso, debilidad, anemia y baja en la producción de leche.



Dosis

Bovinos (carne y leche), ovinos y caprinos: Aplicar 1 mL por cada 10 kg de peso vivo (equivalente a 10 mg de albendazol, 1.5 mg de sulfato de cobalto y 0.25 mg de selenito de sodio por kg de peso), en dosis única a criterio del Médico Veterinario.



Vía de administración

Oral.



Especie

Bovinos (carne y leche), ovinos y caprinos.

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO



Presentaciones

250 mL, 1L, y 5L.



Tiempo de retiro

-No utilizar para consumo humano la carne de animales tratados hasta 30 días después de la última aplicación en bovinos y 7 días en ovinos y caprinos.

-No utilizar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 3 días después de la última aplicación en bovinos y en ovinos y caprinos 4 días.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche el envase por medio de la incineración.



Advertencias

- Agitar antes de usarse.
- Al igual que cualquier fármaco pueda presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No exceder de la dosis recomendada contra *Fasciola hepática*.
- No administrar el producto en caso de tener una dieta muy alta en selenio y/o cobalto.

