

Adecto 1%

No. DE REGISTRO Q-0970-016 | USO VETERINARIO | Solución inyectable

Registros sanitarios: GT: MX542-104-01-7757 NI: MV-11063 PA: RF-6183-22 SV: VE2019055570 HN: MV-14838



Fórmula

Cada 100 mL contiene:

Ivermectina 1g
Vehículo c.b.p 100 mL



Indicaciones

Adecto 1% está indicado en parasitosis externas e internas tales como parasitosis gastrointestinales y pulmonares, tanto sobre las formas adultas como los estados larvarios. BOVINOS: Nemátodos gastrointestinales: *Haemonchus placei*, *Ostertagia lyrata*, *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Bunostomum phlebotomum*. Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*, *Parafilaria bovicola*. *Thelazia* spp. (gusano ocular) Larvas de mosca: *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum* Piojos: *Linognathus vituli*, *Linognathus pedalis*, *Haematopinus eurysternus*, *Damalinia bovis* (Piojos penetrantes). Ácaros: *Psoroptes ovis* var. *bovis*, *Sarcoptes bovis*, *Chorioptes* spp. OVINOS Y CAPRINOS: Nemátodos gastrointestinales: *Haemonchus contortus*, *Haemonchus placei*, *Ostertagia circumcincta*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia curticei* *Nematodirus spathiger*, *Strongyloides papillosus* *Oesophagostomum columbianum*, *Oesophagostomum venulosum*, *Chabertia ovina* *Trichuris ovis*, *Gaigeria pachys celis* Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus filaria*, *Protostrongylus rufescens* Larvas nasales: *Oestrus ovis* Ácaros: *Psoroptes communis* var. *ovis*, *Psorergates ovis*, *Sarcoptes scabiei*.



Dosis

Bovinos (carne), ovinos y caprinos (carne): 1 mL/50 kg de peso corporal (equivalente a 200 mcg de ivermectina por kg de peso corporal).



Vía de administración

Subcutánea.



Especie

Bovinos (carne), ovinos y caprinos (carne).

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO



Presentaciones

10 mL, 50 mL, 100 mL , 250 mL, 500 mL.



Tiempo de retiro

-No usar este producto 28 días antes del sacrificio de bovinos (carne), caprinos (carne) y ovinos destinados para consumo humano.
-No se administre este producto en bovinos y caprinos en producción de leche que se destina al consumo humano.



Almacenamiento

-Protéjase de la luz solar directa.
-Debido a la toxicidad de la ivermectina a los organismos acuáticos, los envases y residuos deberán desecharse en forma segura por medio de la incineración o enterrándolos.
-Tratamiento por infestaciones de garrapatas *Boophilus* spp.



Advertencias

-Evitar la aplicación conjunta con medicamentos que causan depresión del sistema nervioso.
-Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

-No aplicar por vía intramuscular o intravenosa.
-No aplicar más de 10 mL en el mismo sitio de aplicación.
-No existe un antídoto específico: tratamiento sintomático y de sostén.

