

Advac Newcastle

No. DE REGISTRO B-0970-007 | USO VETERINARIO | Liofilizado más diluyente adjunto
Registros sanitarios: GT: MX542-65-63-13453 NI: MV-11337 PA: RB-700-19 SV: VE2019055573 HN: MV-2881



Fórmula

Cada 1 mL contiene:

Virus activo de la enfermedad de Newcastle cepa La Sota, obtenido en embrión de pollo SPF 1×10^7 DIEP₅₀
Diluyente adjunto: Agua inyectable estéril.



Indicaciones

Vacuna indicada para la inmunización activa contra la enfermedad de Newcastle en aves domésticas (*Gallus gallus domesticus*), dedicadas a la producción de huevo, carne, reproductoras y de combate.



Dosis

- Vía ocular o nasal: 1 gota por ave.
 - Vía oral en agua de bebida: 1 mL/litro de agua por cada 25 aves.
- Se recomienda aplicar en las aves domésticas (*Gallus gallus domesticus*), desde la 1ra. a 2da. semana de edad y aplicar un refuerzo a la 3ra. a 6ta. semana después. La frecuencia de revacunación será cada 3 a 4 meses según la zona o incidencia de la enfermedad.



Vía de administración

Ocular, nasal u oral en agua de bebida.



Especie

Aves domésticas (*Gallus gallus domesticus*) productoras de carne, huevo, reproductoras y de combate.



Tiempo de retiro

No administrar este producto 15 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO



Presentaciones

1 mL (25 dosis), 2 mL (50 dosis), 4 mL (100 dosis), y 40 mL (1,000 dosis).



Almacenamiento

- Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C.
- Evítese la congelación y la exposición a la luz solar directa.
- Deseche el frasco y sobrante mediante la incineración.



Advertencias

- La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina.
- Aplíquese únicamente en aves sanas.
- Una vez reconstituida debe aplicarse inmediatamente todo el contenido.
- El virus del Newcastle puede producir conjuntivitis en el humano por 2 o 3 días; evite tocarse los ojos cuando trabaje con esta vacuna.
- Lávese las manos después de su preparación.
- El manejo o administración inadecuada puede causar modificaciones en los resultados esperados.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

