

Advac Puppy Parvo Corona

No. DE REGISTRO B-0970-024 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.

Registros sanitarios: GT: MX542-65-03-7009 NI: MV-10840 HN: PB-928 PA: RB-611-15 SV: MV-338



Fórmula

Cada dosis de 1 ml contiene:

Parvovirus canino tipo 2b, cepa Cornell 10^{3.0} DITC_{50%}

Coronavirus canino CCV-TN 449 10^{3.0} DITC_{50%}

Adsorbidos en hidróxido de aluminio.



Indicaciones

Advac Puppy Parvo Corona está indicada para la vacunación de perros sanos para la prevención de la enteritis canina causada por el parvovirus y coronavirus canino.



Dosis

Aplicar 1 ml (1 dosis) a partir de 6 semanas de edad en adelante.



Modo de empleo

Tomar el contenido total del frasco y aplicarlo inmediatamente, previa antisepsia del sitio de aplicación.



Vía de administración

Intramuscular o subcutánea.



Especie

Caninos.



Duración de la inmunidad

Revacunar a las 2 o 3 semanas después, a criterio del Médico Veterinario. Tomar en consideración los anticuerpos maternos, los cuales pueden interferir con una buena inmunidad. Revacunar anualmente.



Presentaciones

Blíster con 24 dosis (1 ml cada uno).



Almacenamiento

- Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C.
- Evítese la congelación y la exposición a la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina.
- Aplicarse únicamente en animales sanos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

No vacunar hembras gestantes a ninguna etapa de preñez.



**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**