

Admicin 20% L.A.

No. DE REGISTRO Q-0970-015 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.
Registros sanitarios: GT: MX542-07-01-6638 NI: MV-11059 HN: MV-1-5831 PA: RF-6185-22



Fórmula

Cada 1 ml contiene:

Oxitetraciclina base 200 mg.
Vehículo c.b.p 1 ml.



Indicaciones

Es un antibiótico de amplio espectro y de acción prolongada que actúa contra bacterias Gram positivas, Gram negativas, Micoplasma y Rickettsias sensibles a la fórmula, causantes de enfermedades como: Anaplasmosis, Neumonías bacterianas, Pasteurelosis, Mastitis, Metritis, Diarreas, Leptospirosis, Clostridiasis, Artritis Infecciosa, Actinobacilosis, Ántrax, Listeriosis y Micoplasmosis que afectan a los bovinos (carne y leche), ovinos y caprinos.



Dosis

1 ml/10 kg de peso corporal (equivalente a 20 mg de oxitetraciclina por kg de peso corporal). Cada 72 horas como segunda aplicación en caso de infecciones severas o a criterio del Médico Veterinario.



Vía de administración

Intramuscular profunda.



Especie

Bovinos (carne y leche), ovinos y caprinos.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Presentaciones

50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml.

**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**



Advertencias

- Después de la administración intramuscular puede provocar reacción local, con una coloración amarillenta.
- En bovinos: no aplicar más de 10 ml en un solo sitio de inyección.
- En ovinos y caprinos no aplicar más de 5 ml en un solo sitio de aplicación.
- Su uso prolongado puede inducir el desarrollo de micosis por supresión de la flora normal.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- Contraindicado en animales hipersensibles a la fórmula.
- No administrar durante la primera mitad de la gestación, ya que afecta el desarrollo dental ocasionando pigmentación permanente de los dientes (amarillo, gris parduzco), así como alteraciones de desarrollo esquelético, debido a su acción quelante con el calcio.
- No combinar con otros antibióticos como amikacina, ampicilina sódica, glucocorticoides y penicilina G.
- No aplicar en animales en crecimiento.



Tiempo de retiro

- No usar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 96 horas después de la última aplicación.
- No usar este producto 28 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

