

Admicin Plus 10%

No. DE REGISTRO Q-0970-050 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.
Registros sanitarios: GT: MX542-07-01-6744 PA: RF-8337-18 SV: VE2018015396



Fórmula

Cada 1 ml contiene:

Oxitetraciclina base 100 mg.
Vehículo c.b.p. 1 ml.



Indicaciones

Es un antibiótico indicado en infecciones causadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas, Micoplasma y Rickettsias, sensibles a la fórmula, causantes de enfermedades como: anaplasmosis, neumonías bacterianas, pasteurelosis, mastitis, metritis, diarreas, leptospirosis, clostridiasis, artritis infecciosa, actinobacilosis, ántrax, listeriosis y micoplasmosis que afectan a los bovinos (carne y leche), ovinos y caprinos; en caninos y felinos para neumonía, bronquitis, pleuresía, peritonitis y como terapia de apoyo en moquillo canino.



Dosis

- **Bovinos (carne y leche), ovinos y caprinos:** 1 ml/20 kg de peso corporal (equivalente a 5 mg de oxitetraciclina por kg de peso corporal), cada 24 h durante 3-5 días.
- **Caninos y felinos:** 1 ml/10-20 kg de peso corporal (equivalente a 5-10 mg de oxitetraciclina por kg de peso corporal), cada 24 hr durante 3-5 días.
- **En caso de Anaplasmosis:** 2 ml/10 kg de peso corporal (equivalente a 20 mg/kg de peso corporal) en bovinos (carne y leche), a criterio del Médico Veterinario.



Vía de administración

Intramuscular profunda.



Especie

Bovinos (carne y leche), ovinos, caprinos, caninos y felinos.



Presentaciones

20 ml, 100 ml y 500 ml.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 y 30 °C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- Después de la administración intramuscular puede provocar reacción local, con una coloración amarillenta.
- En bovinos: no aplicar más de 10 ml en un solo sitio de inyección.
- En ovinos y caprinos: no aplicar más de 5 ml en un solo sitio de aplicación.
- Su uso prolongado puede inducir el desarrollo de micosis por supresión de la flora normal. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- Contraindicado en animales hipersensibles a la fórmula.
- No aplicar en animales en crecimiento.
- No administrar durante la primera mitad de la gestación, ya que afecta el desarrollo dental ocasionando pigmentación permanente de los dientes (amarillo, gris parduzco), así como alteraciones de desarrollo esquelético, debido a su acción quelante con el calcio.
- No combinar con otros antibióticos como amikacina, ampicilina sódica, glucocorticoides y Penicilina G.



Tiempo de retiro

- No usar este producto 28 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- No usar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 96 horas después de la última aplicación.

**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**

