

Adbac 8 vías®

No. DE REGISTRO B-0970-013 | USO VETERINARIO | Suspensión inyectable.
Registros sanitarios: GT: MX542-64-421-14968 HN: MV-2-1019 PA: MV-010833

Fórmula

Cada 1 ml contiene:

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Clostridium chauvoei</i> | 1 x 10 ⁹ UFC |
| <i>Clostridium septicum</i> | 1 x 10 ⁹ UFC |
| <i>Clostridium novyi</i> | 1 x 10 ⁹ UFC |
| <i>Clostridium sordellii</i> | 1 x 10 ⁹ UFC |
| <i>Clostridium perfringens tipo B</i> | 1.5 x 10 ⁸ UFC |
| <i>Clostridium perfringens tipo C</i> | 1.5 x 10 ⁸ UFC |
| <i>Clostridium perfringens tipo D</i> | 1.5 x 10 ⁸ UFC |
| <i>Pasteurella multocida</i> | 3 x 10 ⁸ UFC |
| <i>Mannheimia haemolytica serotipo A1</i> | 3 x 10 ⁸ UFC |
| <i>E. coli</i> | 1 x 10 ⁹ UFC |
| Adsorbidos en hidróxido de aluminio | 0.25% |

Indicaciones

Adbac 8 vías está indicada para la prevención del carbón sintomático, edema maligno, hepatitis necrótica infecciosa, enterotoxemias, miositis, pasteurelisis, infecciones por *Mannheimia haemolytica* y *E. coli*.

Dosis

Bovinos: 5 ml. Ovinos y caprinos: 2.5 ml.

Vía de administración

Intramuscular o subcutánea.

Especie

Bovinos, ovinos y caprinos.

Tiempo de retiro

- No administrar este producto 21 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.
- No hay periodo de retiro en leche.

Presentaciones

50 ml, 100 ml y 250 ml.

Almacenamiento

- Consérvese en refrigeración entre 4 a 8 °C.
- Evite la congelación y la exposición a la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.

Advertencias

- Agítese antes de usarse.
- Cuando se administre por primera vez, debe aplicarse un refuerzo 2 a 3 semanas después.
- La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina y/o antihistamínicos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**