

# Adecto 1%

No. DE REGISTRO Q-0970-016 | USO VETERINARIO | Solución inyectable

Registros sanitarios: GT: MX542-104-01-7757 NI: MV-11063 PA: RF-6183-22 SV: VE2019055570 HN: PF-4838



## Fórmula

### Cada 100 ml contiene:

Ivermectina ..... 1g  
Vehículo c.b.p ..... 100 ml



## Indicaciones

Adecto 1% está indicado en parasitosis externas e internas tales como parasitosis gastrointestinales y pulmonares, tanto sobre las formas adultas como los estados larvarios. BOVINOS: Nemátodos gastrointestinales: *Haemonchus placei*, *Ostertagia lyrata*, *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Bunostomum phlebotomum*. Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*, *Parafilaria bovicola*, *Thelazia spp.* (gusano ocular) Larvas de mosca: *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum* Piojos: *Linognathus vituli*, *Linognathus pedalis*, *Haematopinus eurysternus*, *Damalinia bovis* (Piojos penetrantes). Ácaros: *Psoroptes ovis var. bovis*, *Sarcoptes bovis*, *Chorioptes spp.*

OVINOS Y CAPRINOS: Nemátodos gastrointestinales: *Haemonchus contortus*, *Haemonchus placei*, *Ostertagia circumcincta*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia curticei*, *Nematodirus spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum columbianum*, *Oesophagostomum venulosum*, *Chabertia ovina*, *Trichuris ovis*, *Gaigeria pachys celis* Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus filaria*, *Protostrongylus rufescens* Larvas nasales: *Oestrus ovis* Ácaros: *Psoroptes communis var. ovis*, *Psorergates ovis*, *Sarcoptes scabiei*.



## Dosis

Bovinos (carne), ovinos y caprinos (carne): 1 ml/50 kg de peso corporal (equivalente a 200 mcg de ivermectina por kg de peso corporal).



## Vía de administración

Subcutánea.



## Especie

Bovinos (carne), ovinos y caprinos (carne).

**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**



## Presentaciones

10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml.



## Tiempo de retiro

- No usar este producto 28 días antes del sacrificio de bovinos (carne), caprinos (carne) y ovinos destinados para consumo humano.
- No se administre este producto en bovinos y caprinos en producción de leche que se destina al consumo humano.



## Almacenamiento

- Protéjase de la luz solar directa.
- Debido a la toxicidad de la ivermectina a los organismos acuáticos, los envases y residuos deberán desecharse en forma segura por medio de la incineración o enterrándolos.
- Tratamiento por infestaciones de garrapatas *Boophilus spp.*



## Advertencias

- Evitar la aplicación conjunta con medicamentos que causan depresión del sistema nervioso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



## Contraindicaciones

- No aplicar por vía intramuscular o intravenosa.
- No aplicar más de 10 ml en el mismo sitio de aplicación.
- No existe un antídoto específico: tratamiento sintomático y de sostén.

