

Advac Puppy PAD

No. DE REGISTRO B-0970-025 | USO VETERINARIO | Liofilizado más diluyente adjunto.
Registros sanitarios: GT: MX542-65-43-3998 NI: MV-10839 PA: RB-609-15 SV: VE2020015657



Fórmula

Cada vial contiene no menos de los siguientes títulos:

Parvovirus canino cepa HPTK 1.....10^{3.0} TCID₅₀
Adenovirus canino cepa tipo 2 HTK2.....10^{3.0} TCID₅₀
Distemper canino cepa MTK1.....10^{3.0} TCID₅₀

Diluyente

Agua inyectable estéril.....1 ml



Indicaciones

Advac Puppy PAD está indicada para la inmunización de cachorros caninos sanos contra el Parvovirus, Adenovirus canino tipo 2, Hepatitis viral y el Distemper canino.



Dosis

1 ml (Equivalente a una dosis de Advac Puppy PAD).



Vía de administración

Intramuscular o subcutánea.



Especie

Caninos.



Modo de preparación

Agregar diluyente adjunto (agua inyectable estéril) al vial (Liofilizado) y mezclar perfectamente.



Almacenamiento

- Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C.
- Evite la congelación.
- Deseche por medio de la incineración.



Duración de la inmunidad

Se recomienda aplicar como primera dosis a las 8 - 12 semanas de edad de cachorro, revacunar a los 15 días posteriores.

El número de revacunaciones dependerá del criterio del Médico Veterinario, así como la incidencia de la zona, época del año y de la condición particular de cada animal.



Presentaciones

Blíster con 12 dosis (1 ml cada uno).



Advertencias

- La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina.
- Aplicar en animales sanos y previamente desparasitados.
- Las hembras deberán ser inmunizadas antes de la gestación para que los anticuerpos maternos resultantes protejan a los cachorros a través del calostro.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

No administrar en animales enfermos.



**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**