

Calciler MAX

No. DE REGISTRO Q-0970-041 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.

Registros sanitarios: GT: MX542-07-05-9262 NI: MV-11982 HN: PF-4860 PA: RF-8651-19



Fórmula

Cada 100 ml contiene:

Gluconato de calcio	26 g
Dextrosa anhidra	8 g
Ácido bórico	5.2 g
Hipofosfito de magnesio	1.46 g
Nicotinamida (Vit.B3)	100 mg
Tiamina (Vit.B1)	0.24 mg
Piridoxina (Vit. B6).....	20 mg
Riboflavina (Vit. B2)	12 mg
DL- Isoleucina	8 mg
L-Arginina HCL	8 mg
L-Histidina HCL	5.6 mg
L-Metionina	4.8 mg
D-Pantenol	1.2 mg
Vehículo c.b.p	100 ml



Indicaciones

Está indicado para el tratamiento de los trastornos metabólicos del calcio y minerales, que afectan a:

- **Bovinos (carne y leche):** raquitismo, hipocalcemia (fiebre de leche), tetania de los pastos, estados de estrés, acetonemia (toxemia de la preñez), osteomalacia y calambres.
- **Equinos no destinados para consumo humano:** raquitismo, hipocalcemia (tetania hipocalcemia), tetania de los pastos, estados de estrés y calambres.
- **Ovinos (carne):** raquitismo, hipocalcemia (fiebre de leche), acetonemia (toxemia de la preñez), tetania de los pastos, estados de estrés y calambres.
- **Caprinos (carne y leche):** raquitismo, hipocalcemia (fiebre de leche), acetonemia (toxemia de la preñez), tetania de los pastos, estados de estrés y calambres.
- **Caninos:** raquitismo, hipocalcemia (tetania puerperal, eclampsia), osteomalacia y calambres.



Dosis

- Bovinos (carne y leche) y Equinos: 200 a 500 ml.
- Ovinos (carne) y Caprinos (carne y leche): 15 a 30 ml.
- Caninos: 5 a 10 ml.



Vía de administración

Intravenosa lenta, intramuscular profunda o subcutánea.

**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**



Especie

Bovinos (carne y leche), Equinos, Ovinos (carne), Caprinos (carne y leche) y Caninos



Presentaciones

Envase de 500 ml.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 y 30 °C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- Por vía intravenosa, deberá administrarse lentamente 100 ml (15 a 20 minutos).
- La dosis puede ser dividida, una mitad por vía IV y la otra mitad por vía IM o SC.
- Todas las sales por vía IV pueden favorecer la presencia de shock o bloqueo cardiaco, en particular en equinos; use la vía IM en soluciones más diluidas, caliente el producto a la temperatura corporal.
- Revise la frecuencia cardiaca antes de la aplicación, 70 por minuto como máximo durante la aplicación de cualquier calcio.
- En caso de presentarse arritmia cardiaca, sudación, lagrimeo, polipnea y espasmos musculares, suspenda inmediatamente la aplicación y continúe posteriormente en forma más lenta cuando el animal haya recuperado la normalidad de sus constantes fisiológicas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No administrar en combinación con Sulfas.

