

No. DE REGISTRO Q-0970-004 | USO VETERINARIO | Solución inyectable. Registros sanitarios: GT: MX542-07-07-6771 NI: MV-10849 HN: MV-1-5993 PA: RF-8340-18 SV: MV-0045092024



### **Fórmula**

# Cada dosis de 100 ml contiene:

Borogluconato de calcio	26 g
Dextrosa	26 g
Borogluconato de magnesio	8 g
Fósforo elemental	0.500 g
Vehículo c.b.p.	100 ml



#### **Indicaciones**

Está indicado para el tratamiento de la hipocalcemia (fiebre de leche) y acetonemia, paresias, hipocalcemias, raquitismo, osteoporosis y otras manifestaciones por deficiencia de calcio, fósforo, magnesio y glucosa que afectan a los bovinos (carne y leche), equinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.



## **Dosis**

- Bovinos (carne y leche): 500 ml.
- Equinos: 250 a 500 ml.
- Ovinos y caprinos: 50 a 125 ml.
- Caninos: 10 a 40 ml.
- Felinos: 5 a 15 ml.
- En caso de ser necesario, repetir la dosis de 2 a 6 horas posteriores, a criterio del Médico Veterinario.
- Se puede administrar simultáneamente por vía intravenosa y vía intramuscular.
- Fiebre de leche: aplicar de 250 a 500 ml durante 1 a 3 días antes del parto, como preventivo.



# Vía de administración

Intravenosa lenta o intramuscular.



### **Especie**

Bovinos, Equinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.



# **Presentaciones**

Envase 500 ml.



#### **Almacenamiento**

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche el envase por medio de la incineración.




### **Advertencias**

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



# Contraindicaciones

- No administrar por vía intramuscular más de 15 ml. en la zona de aplicación.



USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.