

# Cefaline RTU

No. DE REGISTRO Q-0970-031 | USO VETERINARIO | Suspensión inyectable.

Registros sanitarios: GT: MX542-07-01-7755 NI: MV-10341 HN: PF-4853 PA: RF-7624-16



## Fórmula

### Cada 100 ml contiene:

Ceftiofur base  
(como Ceftiofur clorhidrato)..... 5 g  
Vehículo c.b.p. .... 100 ml



## Indicaciones

está indicado para el tratamiento de las enfermedades causadas por bacterias susceptibles al Ceftiofur. Bovinos: enfermedad respiratoria causada por: *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Haemophilus somnus*, Necrobacilosis interdigital o Gabarro: *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides melaninogenicus*, Mastitis: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *S. dysgalactiae*, *S. uberis*, *E. coli*. Clostridiasis: *C. chauvoei*, *C. septicum*, *C. novyi*, *C. perfringens*, *C. sordelli*, *C. botulinum*, *C. haemolyticum*.



## Dosis

Bovinos carne y leche: 1 a 2 ml/50 kg de peso corporal (equivalente a 1-2 mg de Ceftiofur por kg de peso corporal), cada 24 horas durante 3 a 5 días.



## Vía de administración

Intramuscular y/o subcutánea.



## Especie

Bovinos (carne y leche).



## Presentaciones

100 ml y 250 ml.



## Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



## Advertencias

- Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
- La administración prolongada del producto puede dar como resultado la sensibilización.
- Evite el contacto directo con la piel, ojos, boca y ropa.
- En caso de exposición ocular accidental, lave con abundante agua durante 15 minutos.
- Agítese bien antes de usarse.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



## Tiempo de retiro

- No usar este producto 48 horas antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.
- Cero días de retiro en leche.



**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**