

Contrac 20

No. DE REGISTRO Q-0970-049 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.
Registros sanitarios: GT: MX542-26-06-6639 NI: MV-11061 HN: PF-6349 PA: RF-6268-22



Fórmula

Cada 1 ml contiene:

Oxitocina sintética 20 UI
Vehículo c.b.p 1 ml



Indicaciones

La oxitocina es un inductor de la contracción del músculo liso uterino que ayuda en acelerar el parto, inducir la expulsión de placentas retenidas, desecho de líquidos y de naturaleza purulenta en condiciones de piometra; y de fetos momificados o macerados. Estimula la bajada de la leche para obtener mejores beneficios después del parto y durante la ordeña, coadyuvando además en el tratamiento de la mastitis en Bovinos (carne y leche), Caprinos (carne y leche), Ovinos, Caninos, Felinos y Equinos no destinados al consumo humano.



Dosis

- Bovinos y equinos: 5 ml (equivalente a 100 UI de oxitocina), en dosis única.
- Ovinos y caprinos: 1 a 2.5 ml (equivalente de 20 a 100 UI de oxitocina), en dosis única.
- Caninos y felinos: 0.5 a 1 ml (equivalente de 10 a 20 UI de oxitocina), en dosis única.



Vía de administración

Intramuscular profunda e intravenosa lenta.



Especie

Bovinos (carne y leche), Caprinos (carne y leche), Ovinos, Caninos, Felinos y Equinos no destinados al consumo humano.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 a 30 °C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Presentaciones

10 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml.



Advertencias

- No administrar a hembras gestantes a no ser que se desee provocar el parto.
- No se administre este producto en equinos destinados para consumo humano.
- No se use en casos de estrechez pélvica o en partos distócicos, por mala posición del producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Tiempo de retiro

- No usar este producto 24 horas antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- No consuma la leche procedente de animales tratados hasta 24 horas después de la última aplicación.



**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**