

Ganaler Forte

No. DE REGISTRO Q-0970-030 | USO VETERINARIO | Suspensión inyectable.
Registros sanitarios: GT: MX542-42-08-7761 NI: MV-10852 HN: PF-4841 PA: RF-8334-18



Fórmula

El frasco con polvo contiene:

Diacetato de 4-4 diazoaminodibenzamida 1.5 g
Oxitetraciclina base 4.0 g
Cianocobalamina (Vit.B12) 1,000 mcg

El frasco con diluyente contiene:

Dipirona sódica 7 g
Vehículo c.b.p. 25 ml.



Indicaciones

Es una combinación de diferentes activos que actúan contra la Babesiosis (Piroplasma), anaplasma y tripanosomiasis; además de estimular el apetito, la formación de glóbulos rojos; así como disminuir el dolor, espasmos y fiebre que afectan a los bovinos, ovinos y caprinos.



Dosis

1 ml por cada 20 kg de peso corporal, cada 24 horas, durante 2 a 3 días a consideración de Médico Veterinario.



Vía de administración

Intramuscular.



Especie

Bovinos (carne y leche), Caprinos y Ovinos.



Presentaciones

Frasco con polvo estéril y diluyente de 25 ml.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.

**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**



Advertencias

- Reconstituya con el diluyente adjunto y agítelo perfectamente antes de administrarse.
- Una vez hecha la mezcla, la suspensión presenta color amarillento que puede variar a rojizo.
- Evite la administración en conjunto con drogas hepatotóxicas o nefrotóxicas.
- Administre con precaución en animales con disfunción hepática o renal.
- En caso de salivación, secreción nasal y vómito antídoto: Atropina.
- Puede presentar dolor en el sitio de aplicación.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No administrar por vía intravenosa.
- No administrar a pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.



Tiempo de retiro

- No usar este producto 21 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.
- No utilizar la leche para consumo o para la fabricación de derivados lácteos hasta 72 horas después de la última aplicación.

