

Neodip50

No. DE REGISTRO Q-0970-019 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.

Registros sanitarios: GT: MX542-02-01-7758 NI: MV-10854 HN: PF-4855 PA: RF-8335-18 SA: VE2017095339

Fórmula

Cada 1 ml contiene:

Dipirona 500 mg.
Vehículo c.b.p. 1 ml.

Indicaciones

Está indicado como antiinflamatorio, antiespasmódico en la distensión abdominal aguda, como antipirético en las afecciones de curso febril de origen infeccioso o no, y como analgésico en el dolor intenso y en los procesos inflamatorios, que afectan a los bovinos (carne y leche), equinos no destinados para consumo humano, ovinos, caprinos caninos y felinos.

Dosis

- **Bovinos (leche y carne):** 1 ml/12.5-25 kg de peso corporal (equivalente a 20-40 mg de dipirona por kilogramo de peso corporal).
- **Equinos:** 1 ml/10-25 kg de peso corporal (equivalente a 20-50 mg de dipirona por kilogramo de peso corporal).
- **Ovinos y Caprinos:** 1 ml/10 kg de peso corporal (equivalente a 50 mg de dipirona por kilogramo de peso corporal);
- **Caninos y Felinos:** 0.5 ml/10 kg de peso corporal (equivalente a 25 mg de dipirona por kilogramo de peso corporal).

Cada 8 a 12 horas, durante 3 a 5 días, a consideración del Médico Veterinario.

Vía de administración

Intramuscular e intravenosa.

Presentaciones

20 ml, 100 ml y 250 ml.

Especie

Bovinos (carne y leche), equinos, ovinos, caprinos caninos y felinos.

**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**

Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.

Advertencias

- Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Contraindicaciones

- No se administre en animales con insuficiencia renal y/o hepática aguda o crónica.
- No administrar este producto a animales con discrasia sanguínea.
- No emplear Fenilbutazona o Barbitúricos a la vez con Dipirona.

Tiempo de retiro

- No usar este producto 4 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.
- No usar en equinos destinados a consumo humano.
- No usar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 4 días después de la última aplicación.

