

Sulfaler³

No. DE REGISTRO Q-0970-039 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.
Registros sanitarios: GT: MX542-07-01-17939 NI: MV-15880 HN: MV-07496



Fórmula

Cada 100 ml contienen:

Sulfadiazina	6.67 g.
Sulfametazina	6.67 g.
Sulfamerazina	6.67 g.
Vehículo c.b.p.	100 ml.



Indicaciones

Es un antibacteriano de amplio espectro actúa contra bacterias Gram positivas, Gram negativas y algunos otros protozoos, causantes de procesos infecciosos en: **Bovinos (carne), ovinos (carne) y caprinos (carne):** Abscesos, Actinobacilosis, Actinomycosis, Coccidiosis, Colibacilosis, Gabarro, Infecciones del ombligo, Listeriosis, Mastitis, Metritis, Neumonías, ojo rosado, Pasteurelisis, *Salmonelosis*, *Septicemias*. **Equinos:** Abscesos, Actinobacilosis, Actinomycosis, Artritis por *Corynebacterium*, Colibacilosis, Infecciones del ombligo, Infecciones urinarias, Listeriosis, Metritis, Neumonías, Pasteurelisis, *Salmonelosis*, *Septicemias*. **Caninos y felinos:** Colibacilosis, Coccidiosis, Piodermas, Infecciones urinarias, Neumonías, *Salmonelosis*, Shigelosis. **Aves (engorda, reproducción y reemplazo):** Coccidiosis, Cólera aviar, Colibacilosis, Coriza infecciosa, Infecciones respiratorias crónicas y *Salmonelosis*.



Dosis

- **Bovinos (carne), ovinos (carne), caprinos (carne):** 1 ml/2 kg (equivale a 33.35 mg de Sulfadiazina, 33.35 mg de Sulfametazina y 33.35 mg de Sulfamerazina por kg de peso corporal), cada 24 horas durante 5 a 7 días por vía intravenosa lenta o intramuscular a criterio del Médico Veterinario.
- **Equinos, caninos y felinos:** 1 ml/2 kg (equivale a 33.35 mg de Sulfadiazina, 33.35 mg de Sulfametazina y 33.35 mg de Sulfamerazina por kg de peso corporal) cada 24 horas durante 5 a 7 días por vía intravenosa lenta a criterio del Médico Veterinario.
- **Aves (engorda, reproducción y reemplazo):** 5 ml/litro de agua (equivale a 333.5 mg de Sulfadiazina, 333.5 mg de Sulfametazina y 333.5 mg de Sulfamerazina), cada 24 horas durante 5 a 7 días por vía oral en agua de bebida a criterio del Médico Veterinario.



Vía de administración

Intravenosa lenta, intramuscular y oral en agua de bebida (aves).

**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**



Especie

Bovinos (carne), equinos, ovinos (carne), caprinos (carne), caninos, felinos y aves (engorda, reproducción y reemplazo).



Presentaciones

100 ml. y 500 ml.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- Evite el tratamiento prolongado con este producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No administrar en animales sensibles a las sulfonamidas.
- No usar en pacientes con daño renal.
- No usar este producto en animales de producción de leche.
- No usar este producto en equinos destinados para consumo humano.



Tiempo de retiro

- No usar este producto 12 días antes del sacrificio de los bovinos destinados para consumo humano.
- No usar este producto 5 días antes del sacrificio de los ovinos y caprinos destinados para consumo humano.
- No usar este producto 15 días antes del sacrificio de las aves destinadas para consumo humano.

