

Amidan Vitaminado

No. DE REGISTRO Q-0970-040 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.
Registros sanitarios: GT: MX542-07-15-10132 NI: MV-12027 HN: PF-4844 PA: MV-9555



Fórmula

Cada 100 ml contiene:

Dextrosa anhidra	5.6 g.
Cloruro de potasio	20 mg.
Cloruro de magnesio	20 mg.
Cloruro de calcio	16 mg.
L-Lisina clorhidrato	37 mg.
DL-Valina	30 mg.
Glutamato monosódico	4 mg.
L-Leucina	4 mg.
DL-Fenilalanina	3 mg.
L-Arginina clorhidrato	2.5 mg.
DL-Isoleucina	2 mg.
L-Treonina	2 mg.
DL-Triptófano	1 mg.
L-Cisteína clorhidrato	1 mg.
L-Histidina clorhidrato	1 mg.
L- Metionina	1 mg.
Nicotinamida (Vit. B3)	150 mg.
Piridoxina clorhidrato (Vit. B6)	12 mg.
Tiamina clorhidrato (Vit. B1)	12 mg.
Riboflavina (Vit. B2)	6 mg.
Cianocobalamina (Vit. B12)	1 mg.
Vehículo c.b.p.	100 ml.



Indicaciones

Está indicado como terapia de apoyo, en donde se requiere una fuente inmediata de electrolitos, aminoácidos, dextrosa y vitaminas; para el restablecimiento de animales convalecientes que han sufrido pérdida de electrolitos por deshidratación aguda o crónica, causada por: diarreas, vómito, animales débiles o enfermos, trabajo intenso, en situaciones de estrés o shock; que afectan a los bovinos (carne y leche), equinos, caprinos (carne y leche), ovinos (carne), caninos y felinos.



Dosis

De 2 a 6 ml/kg de peso corporal.
La frecuencia y duración del tratamiento dependerán de la gravedad del caso y de la respuesta clínica observada a consideración del Médico Veterinario.

**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**



Vía de administración

Intravenosa, intraperitoneal, subcutánea y oral.



Especie

Bovinos (carne y leche), equinos, caprinos (carne y leche), ovinos (carne), caninos y felinos.



Presentaciones

500 ml.



Almacenamiento

- Consérvase en un lugar fresco y seco, a temperatura entre 15 y 30 °C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
- La administración intravenosa deberá realizarse lentamente.
- No administrar por vía oral en casos de vómitos, íleo paralítico y deshidrataciones graves o estado de Shock.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

