

Estrepto LER 1 MUI

Extra Forte

No. DE REGISTRO Q-0970-054 | USO VETERINARIO | Polvo estéril y diluyente estéril.
Registros sanitarios: GT: MX542-07-01-9266 NI: MV-11727 HN: MV-16202 PA: RF-8665-20



Fórmula

Frasco con polvo estéril con 2 g contienen:

Penicilina G benzatina	670,000 UI
Penicilina G procaína	330,000 UI
Estreptomina sulfato	0.66 g
Dicloxacilina sódica	34 mg
Diclofenaco sódico	15 mg

Frasco con diluyente estéril contiene:

Clorfeniramina maleato	6.3 mg
Metamizol sódico	131 mg
Guaifenesina	25.5 mg
Ascorbato de sodio (Vitamina C)	81.6 mg
Vehículo c.b.p.	5 ml



Indicaciones

Está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas complicadas con procesos inflamatorios causados por microorganismos sensibles a la combinación de la Penicilina-Estreptomina-Dicloxacilina como son: *Streptococcus*, *Neumococcus*, *Estafilococcus*, *Corynebacterium*, *Pasteurella*, *Haemophilus*, *Klebsiella* y en todos aquellos procesos de enfermedades respiratorias sensibles a la fórmula que cursan con fiebre, decaimiento y moco, ayudando a la expectoración. También tiene valor terapéutico en afecciones del sistema gastrointestinal, órganos urogenitales, glándula mamaria, sistema muscular, clostridiasis, infecciones septicémicas y en aquellas asociadas a heridas quirúrgicas o traumáticas que afectan a bovinos (carne y leche), equinos, ovinos (carne), caprinos (carne y leche) y caninos.



Dosis

1 a 2 ml/20 kg de peso corporal (equivalente a 10,000 a 20,000 UI de Penicilina G Benzatina y Procaína/kg; 6.6 a 13.2 mg de Estreptomina/kg; 0.34 a 0.68 mg de Dicloxacilina/kg; 0.15 a 0.30 mg de Diclofenaco/kg; 0.063 a 0.126 mg de Clorfeniramina maleato/kg; 1.31 a 2.62 mg de Metamizol sódico/kg; 0.255 a 0.510 mg de Guaifenesina/kg; 0.716 a 1.632 mg de Ascorbato de sodio/kg de peso corporal), cada 24 horas, durante 3 a 7 días.



Vía de administración

Intramuscular profunda exclusivamente.

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



Especie

Bovinos (carne y leche), Equinos no destinados al consumo humano, Ovinos (carne), Caprinos (carne y leche) y Caninos.



Presentaciones

Frasco Polvo estéril 2 g (1 MUI) Frasco diluyente estéril de 5 ml.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 y 30 °C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Una vez hecha la mezcla, conserve en refrigeración entre 2 y 8 °C, durante 7 días.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No administrar conjuntamente sulfas sódicas.
- No administrar en animales con insuficiencia renal.



Tiempo de retiro

- No consumir la carne de bovinos, ovinos y caprinos hasta 30 días después del último tratamiento con Estrepto Ler Extra Forte 1 MUI.
- No se consuma la leche de animales tratados con Estrepto Ler Extra Forte 1 MUI hasta 3 días después del último tratamiento.
- No utilizar este producto en equinos destinados para consumo humano.

