

# Estrepto LER 4MUI

## Extra Forte

No. DE REGISTRO Q-0970-024 | USO VETERINARIO | Polvo estéril y diluyente estéril.  
Registros sanitarios: GT: MV-970 NI: MV-11880 HN: MV-16199 PA: PF-8813-20



### Fórmula

#### Frasco con polvo estéril con 8 g contienen:

Penicilina G benzatina .....	2'700,000 UI
UI Penicilina G procaína .....	1'300,000 UI
Estreptomina sulfato .....	2.6 g
Dicloxacilina sódica .....	133 mg
Diclofenaco sódico .....	60 mg

#### Frasco con diluyente estéril contiene:

Clorfeniramina maleato .....	31 mg
Metamizol sódico .....	633 mg
Guaifenesina .....	307 mg
Vehículo c.b.p. ....	20 ml



### Indicaciones

Está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas complicadas con procesos inflamatorios causados por microorganismos sensibles a la combinación Penicilina-Estreptomina-Dicloxacilina como son: *Streptococcus*, *Neumococos*, *Estafilococos*, *Corynebacterium*, *Pasteurella*, *Haemophilus*, *Klebsiella* y en todos aquellos procesos de enfermedades respiratorias sensibles a la fórmula que cursan con fiebre, decaimiento y moco, ayudando a la expectoración y al rápido control de la infección. También está indicado en el tratamiento de afecciones del sistema gastrointestinal, órganos urogenitales, glándula mamaria, sistema muscular, clostridiasis, infecciones septicémicas y en aquellas asociadas a heridas quirúrgicas o traumáticas que afectan a bovinos (carne y leche), equinos, ovinos (carne), caprinos (carne y leche) y caninos.



### Dosis

1 a 2 ml/20 kg de peso corporal (equivalente de 10,000 a 20,000 UI de Penicilina G Benzatina y Procaína/kg; 6.5 a 13 mg de Estreptomina/kg; 0.332 a 0.665 mg de Dicloxacilina/kg; 0.15 a 0.30 mg de Diclofenaco/kg; 0.077 a 0.150 mg de Clorfeniramina maleato/kg; 1.58 a 3.16 mg de Metamizol sódico/kg; 0.767 a 1.53 mg de Guaifenesina/kg de peso corporal). Cada 24 horas, durante 3 a 7 días.



### Vía de administración

Intramuscular profunda exclusivamente.

**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.**  
**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**  
**SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**



### Especie

Bovinos (carne y leche), equinos, ovinos (carne), caprinos (carne y leche) y caninos.



### Presentaciones

Frasco Polvo estéril 8 g (4 MUI) y Frasco diluyente estéril de 10 ml.



### Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 y 30 °C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Una vez hecha la mezcla, conserve en refrigeración entre 2 y 8 °C, durante 7 días.
- Deseche por medio de la incineración



### Advertencias

- Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



### Contraindicaciones

- No administrar conjuntamente sulfas sódicas.
- No administrar en animales con insuficiencia renal.



### Tiempo de retiro

- No utilizar este producto en equinos destinados para consumo humano.
- No consumir la carne de bovinos, ovinos y caprinos hasta 30 días después del último tratamiento con Estrepto Ler Extra Forte 4 MUI.
- No se consuma la leche de animales tratados con Estrepto Ler Extra Forte 4 MUI hasta 3 días después del último tratamiento.

