

# Estrepto LER 6MUI

## ForteDex

No. DE REGISTRO Q-0970-Q25 | USO VETERINARIO | Polvo estéril y diluyente estéril.  
Registros sanitarios: GT: MV-556 NI: MV-12029 HN: MV-16251



### Fórmula

#### Frasco con polvo estéril de 12 g contiene:

Penicilina G benzatina .....	3'000,000 UI
Penicilina G procaína .....	1'800,000 UI
Penicilina G potásica .....	1'200,000 UI
Estreptomina base (como sulfato de estreptomina) .....	4.8 mg
Dexametasona 21 (fosfato) .....	15 mg

#### Frasco con diluyente estéril contiene:

Agua estéril grado farmacéutico .....	30 ml
---------------------------------------	-------



### Indicaciones

Está indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas complicadas con procesos inflamatorios, causadas por microorganismos sensibles a la combinación de las penicilinas y la estreptomina: *Streptococos*, *Neumococos*, *Estafilococos*, *Corynebacterium*, *Pasteurella*, *Haemophilus*, *Klebsiella* y *Listeria*. Esta combinación antibiótica y de un antiinflamatorio tiene valor terapéutico en afecciones del sistema respiratorio, órganos urogenitales, glándula mamaria, sistema muscular, tracto gastrointestinal, infecciones septicémicas y en aquellas asociadas a heridas quirúrgicas o traumáticas en bovinos (carne y leche), equinos, ovinos (carne y leche), caprinos (carne), caninos y felinos.



### Dosis

**Bovinos (carne y leche), equinos, ovinos (carne y leche), caprinos (carne):** 1 a 2 ml/20 kg de peso corporal (equivalente a 10,000 - 20,000 UI de Penicilina G benzatínica, procaína y potásica/kg; de 8 - 16 mg de Estreptomina/kg y de 0.03 - 0.05 mg de Dexametasona/kg de peso corporal).

**Caninos y felinos:** 1 ml/10 kg de peso corporal (equivalente a 10,000 UI de Penicilina G benzatínica, procaína y potásica/kg; a 16 mg de Estreptomina/kg y a 0.05 mg de Dexametasona/kg de peso corporal) cada 24 horas durante 3 a 7 días.



### Especie

Bovinos (carne y leche), equinos, ovinos (carne y leche), caprinos (carne), caninos y felinos.

**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**



### Vía de administración

Intramuscular profunda.



### Presentaciones

Frasco con polvo estéril de 12 g (6 MUI) y frasco con diluyente estéril de 30 ml.



### Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 y 30 °C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Una vez hecha la mezcla, conserve en refrigeración entre 2 y 8 °C durante 7 días.
- Deseche por medio de la incineración.



### Advertencias

- Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



### Contraindicaciones

- No administrar conjuntamente sulfas sódicas.
- No administrar en animales con insuficiencia renal.
- No utilizar en hembras gestantes.



### Tiempo de retiro

- No usar la leche procedente de animales tratados para consumo humano hasta 72 horas posteriores a la última aplicación.
- No utilizar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- No utilizar este producto en equinos destinados para consumo humano.

