

Estrepto LER 6MUI

Extra Forte

No. DE REGISTRO Q-0970-026 | USO VETERINARIO | Polvo estéril y diluyente estéril.
Registros sanitarios: GT: MV542-07-01-9665 NI: MV-11881 HN: MV-16201 PA: RF-8814-20



Fórmula

Frasco con polvo estéril con 12 g contienen:

Penicilina G benzatina	4'000,000
Penicilina G procaína	2'000,000 UI
Estreptomina sulfato	4 g
Dicloxacilina sódica	200 mg
Diclofenaco sódico	90 mg

Frasco con diluyente estéril contiene:

Clorfeniramina maleato	38 mg
Metamizol sódico	790 mg
Guaifenesina	380 mg
Vehículo c.b.p.	30 ml



Indicaciones

está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas complicadas con procesos inflamatorios causados por microorganismos sensibles a la combinación Penicilina-Estreptomina-Dicloxacilina como son: *Streptococcus*, *Neumococcus*, *Estafilococcus*, *Corynebacterium*, *Pasteurella*, *Haemophilus*, *Klebsiella* y en todos aquellos procesos de enfermedades respiratorias sensibles a la fórmula que cursan con fiebre decaimiento y moco, ayudando a la expectoración y al rápido control de la infección. También está indicado en el tratamiento de afecciones del sistema gastrointestinal, órganos urogenitales, glándula mamaria, sistema muscular, clostridiasis, infecciones septicémicas y en aquellas asociadas a heridas quirúrgicas o traumáticas que afectan a bovinos (carne y leche), equinos, ovinos (carne), caprinos (carne y leche) y caninos.



Dosis

1 a 2 ml/20 kg de peso corporal (equivalente de 10,000 a 20,000 UI de Penicilina G Benzatina y Procaína/kg; 6.66 a 13.32 mg de Estreptomina/kg; 0.33 a 0.66 mg de Dicloxacilina/kg; 6.66 a 13.32 mg de Diclofenaco /kg; 0.063 a 0.126 mg de Clorfeniramina maleato /kg; 1.31 a 2.62 mg de Metamizol sódico/kg; 0.63 a 1.26 mg de Guaifenesina/kg de peso corporal). Cada 24 horas, durante 3 a 7 días.



Vía de administración

Intramuscular profunda exclusivamente.

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



Especie

Bovinos (carne y leche), equinos, ovinos (carne), caprinos (carne y leche) y caninos.



Presentaciones

Frasco polvo estéril 12 g (6 MUI) Frasco diluyente estéril de 30 ml.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 y 30 °C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Una vez hecha la mezcla, conserve en refrigeración entre 2 y 8 °C, durante 7 días.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No administrar conjuntamente sulfas sódicas.
- No administrar en animales con insuficiencia renal.



Tiempo de retiro

- No utilizar este producto en equinos para consumo humano.
- No consumir la carne de bovinos, ovinos y caprinos hasta 30 días después del último tratamiento con Estrepto Ler Extra Forte 6 MUI.
- No se consuma la leche de animales tratados con Estrepto Ler Extra Forte 6 MUI hasta 3 días después del último tratamiento.

