

No. DE REGISTRO Q-0970-111 | USO VETERINARIO | Solución inyectable. Registros sanitarios: NI: MV-16449



Fórmula

Cada dosis de 1 ml contiene:

Broml	nexina	clorhidrato	٠	 	3 mg
Vehíc	ulo c.b.	.p		 	1 m



Indicaciones

La Bromhexina es un mucolítico expectorante que disminuye la viscosidad y provoca la fluidificación de las secreciones del epitelio respiratorio. Galton XPCTOR es un producto que se aplica en enfermedades de las vías respiratorias que cursen con incremento de la producción de moco y por su acción expectorante provoquen su eliminación.



Dosis

 Bovinos de acuerdo con su peso administrar de 8 a 30 mL por 5 días que dura el tratamiento (equivalente de 0.2 a 0.5 mg de bromhexina por kg de peso corporal).



Vía de administración

Intramuscular exclusivamente.



Especie

Bovinos destinados a la producción de carne (todas las etapas de crecimiento y producción).



Presentaciones

10, 50 y 100 ml.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco, a una temperatura no mayor de 30 °C.
- Deseche el envase por medio de la incineración.



Advertencias

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No se administre mezclado con otros medicamentos veterinarios.
- No se administre en presencia de edema pulmonar.
- No administrar en el mismo sitio de aplicación más de 20 ml en bovinos.



Tiempo de retiro

Bovinos carne: 8 días.

Bovinos leche: No se administre a bovinos cuya producción de leche se destine al consumo humano.



USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.