

# Admicin 20% L.A.

No. DE REGISTRO Q-0970-015 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.  
Registros sanitarios: GT: MX542-07-01-6638 NI: MV-11059 HN: MV-1-5831 PA: RF-6185-22



## Fórmula

### Cada 1 ml contiene:

Oxitetraciclina base ..... 200 mg.  
Vehículo c.b.p ..... 1 ml.



## Indicaciones

Admicin 20% L.A. es un antibiótico de amplio espectro y de acción prolongada que actúa contra bacterias Gram positivas, Gram negativas, Micoplasma y Rickettsias sensibles a la fórmula, causantes de enfermedades como: Anaplasmosis, Neumonías bacterianas, Pasteurelosis, Mastitis, Metritis, Diarreas, Leptospirosis, Clostridiasis, Artritis Infecciosa, Actinobacilosis, Ántrax, Listeriosis y Micoplasmosis que afectan a los bovinos (carne y leche), ovinos y caprinos.



## Dosis

1 ml / 10 kg de peso corporal (equivalente a 20 mg de oxitetraciclina por kg de peso corporal). En caso de infecciones severas, repetir dosis a las 24 o 48 horas como segunda aplicación a criterio del Médico Veterinario.



## Vía de administración

Intramuscular profunda.



## Especie

Bovinos (carne y leche), ovinos y caprinos.



## Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura 15 y 30°C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



## Presentaciones

50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml.



## Advertencias

- Después de la administración intramuscular puede provocar reacción local, con una coloración amarillenta.
- En bovinos: no aplicar más de 10 ml en un solo sitio de inyección.
- En ovinos y caprinos no aplicar más de 5 ml en un solo sitio de aplicación.
- Su uso prolongado puede inducir el desarrollo de micosis por supresión de la flora normal.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



## Contraindicaciones

- Contraindicado en animales hipersensibles a la fórmula.
- No exceder el tratamiento a 4 días consecutivos.
- No aplicar en animales en crecimiento.
- No administrar durante la primera mitad de la gestación, ya que afecta el desarrollo dental ocasionando pigmentación permanente de los dientes (amarillo, gris parduzco), así como alteraciones de desarrollo esquelético, debido a su acción quelante con el calcio.
- No combinar con otros antibióticos como amikacina, ampicilina sódica, glucocorticoides y Penicilina G.



## Tiempo de retiro

- No usar este producto 28 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- No utilizar la leche procedente de animales tratados hasta 96 horas posteriores a la última aplicación.



## Periodo de caducidad

24 meses a partir de su elaboración.

**INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**

