

Adquin 10

No. DE REGISTRO Q-0970-079 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.



Fórmula

Cada 100 ml contienen:

Enrofloxacin 10 g.
Vehículo c.b.p 100 ml.



Indicaciones

Actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas causantes de infecciones respiratorias digestivas, genitourinarias, de piel, músculo y hueso; Gabarro, Actinobacilosis, Piometra, Leptospirosis, y Listeriosis; así como Micoplasmosis en bovinos (carne y leche) ovinos (carne), caprinos (carne y leche), caninos y aves (pollos y pavos).



Dosis

- **Bovinos (carne y leche):** 1 ml / 20-40 kg de peso corporal (equivalente a 2.5-5 mg de Enrofloxacin por kg de peso corporal), cada 24 horas, durante 3 a 5 días, a criterio del Médico Veterinario.
- **Ovinos (carne), caprinos (carne y leche) caninos y aves (pollos y pavos):** 1 ml / 20 kg de peso corporal (equivalente a 5 mg de Enrofloxacin por kg de peso corporal), cada 24 horas, durante 3 a 5 días, a criterio del Médico Veterinario.



Vía de administración

Intramuscular, intravenosa lenta y subcutánea.



Especie

Bovinos (carne y leche), ovinos (carne), caprinos (carne y leche), caninos y aves (pollos y pavos).



Presentaciones

20 ml, 50 ml y 250 ml.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No administrar en animales en fase de desarrollo.
- No se administre en animales jóvenes (contraindicado en perros de 2 a 8 meses de edad). No utilizar conjuntamente con Cloranfenicol, Tetraciclinas, Rifampicina, Teofilina, Analgésicos no esteroideos y/o cafeína, ya que ocurre antagonismo.
- No administrar más de 15 ml en el sitio de aplicación.



Tiempo de retiro

- No administrar este producto 28 días antes del sacrificio de los animales destinado al consumo humano.
- No utilizar para consumo humano la leche de los animales tratados con este producto hasta 72 horas correspondientes a la última aplicación.
- No destinar para consumo humano la carne de aves (pollos y pavos) 7 días antes de su última aplicación, no administrar en aves en producción de huevo para consumo humano.



Periodo de caducidad

24 meses a partir de su fecha de elaboración.



INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.