

Advac DERRILER

No. DE REGISTRO B-0970-033 | USO VETERINARIO | Liofilizado y diluyente.
Registros sanitarios: GT: MX542-64-52-9772 NI: MV-11783 HN: MV-2915 PA: RB-715-20



Fórmula

Cada 0.3 ml contiene:

Virus activo modificado de Rabia Cepa SAD obtenido en cultivo de tejido 1x10^{3.3} DLR₅₀/0.03 mL



Indicaciones

Advac DERRILER está indicada para la inmunización activa y prevención del Derriengue o Rabia Parálitica en bovinos (carne y leche).



Dosis

Bovinos (leche y carne) aplicar 2 ml.

Se recomienda iniciar la vacunación de Advac DERRILER a partir de las 12 semanas de edad (3er mes), revacunar a los 6 meses y posteriormente cada año. En adultos se recomienda la aplicación cada año.

En zonas endémicas aplicar una primera dosis al mes de edad y refuerzo a los 3 y 6 meses de edad.



Vía de administración

Intramuscular.



Especie

Bovinos (carne y leche).



Presentaciones

12 ml (6ds), 22 ml (11ds) y 30 ml (15ds).



Almacenamiento

- Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C.
- Evítese la congelación y la exposición a la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas; antídoto: Epinefrina.
- Aplíquese en animales sanos.
- No aplicar vacunas ya preparadas después de una hora
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



**USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**