

Adecto 1%

No. de registro: Q-0970-016 | USO VETERINARIO | Solución inyectable
Registros sanitarios: GT: MV-4707 NI: MV-11063 HN: PF-4838 PA: MV-6183 SV: MV-1235



Fórmula

Cada 100 mL contiene:

Ivermectina 1g
Vehículo c.b.p 100 mL



Indicaciones

Adecto 1% está indicado en parasitosis externas e internas tales como parasitosis gastrointestinales y pulmonares, tanto sobre las formas adultas como los estados larvarios. BOVINOS: Nemátodos gastrointestinales: *Haemonchus placei*, *Ostertagia lyrata*, *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Bunostomum phlebotomum*. Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*, *Parafilaria bovicola*, *Thelazia spp.* (gusano ocular) Larvas de mosca: *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum* Piojos: *Linognathus vituli*, *Linognathus pedalis*, *Haematopinus eurysternus*, *Damalinia bovis* (Piojos penetrantes). Ácaros: *Psoroptes ovis var. bovis*, *Sarcoptes bovis*, *Chorioptes spp.*

OVINOS Y CAPRINOS: Nemátodos gastrointestinales: *Haemonchus contortus*, *Haemonchus placei*, *Ostertagia circumcincta*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia curticei*, *Nematodirus spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum columbianum*, *Oesophagostomum venulosum*, *Chabertia ovina*, *Trichuris ovis*, *Gaigeria pachys celis* Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus filaria*, *Protostrongylus rufescens* Larvas nasales: *Oestrus ovis* Ácaros: *Psoroptes communis var. ovis*, *Psorergates ovis*, *Sarcoptes scabiei*.



Dosis

Bovinos (carne), ovinos y caprinos (carne): 1 mL/50 kg de peso corporal (equivalente a 200 mcg de ivermectina por kg de peso corporal) dosis única a criterio del médico veterinario.



Vía de administración

Subcutánea.



Especie

Bovinos (carne), ovinos y caprinos (carne).



Presentaciones

10 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL.



Tiempo de retiro

- No usar este producto 28 días antes del sacrificio de bovinos (carne), caprinos (carne) y ovinos destinados para consumo humano.
- No se administre este producto en bovinos y caprinos en producción de leche que se destina al consumo humano.



Almacenamiento

- Protéjase de la luz solar directa.
- Debido a la toxicidad de la ivermectina a los organismos acuáticos, los envases y residuos deberán desecharse en forma segura por medio de la incineración o enterrándolos.
- Este producto no debe ser utilizado para el tratamiento por infestaciones de garrapatas *Boophilus spp.*



Advertencias

- Evitar la aplicación conjunta con medicamentos que causan depresión del sistema nervioso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No aplicar por vía intramuscular o intravenosa.
- No aplicar más de 10 ml en el mismo sitio de aplicación.
- No existe un antídoto específico: tratamiento sintomático y de sostén.



INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.